

Studenti koji kod pitanja do zvezdica naprave više od osam grešaka nisu položili ispit! U svakom zadatku dano je više odgovora, a treba zaokružiti brojeve ispred tačnih odgovora. U jednom istom zadatku broj tačnih odgovora može biti $0, 1, 2, 3, \dots, svi$. U nekim zadacima ostavljena su prazna mesta za upisivanje odgovora. Na kraju testa su tri zadatka koji se rade u dатој svesci. Obavezno se predaje ovaj test i sveska.

- Pri deljenju polinoma $x^4 + 5x^2 + 4$ sa $x^2 + 1$ nad \mathbb{R} , količnik je _____, a ostatak je _____.
- Asocijativni grupoid sa neutralnim elementom koji nije grupa je: **1)** $(\{-1, 1\}, \cdot)$ **2)** $(\{-1, i, 1, -i\}, \cdot)$ **3)** $((0, 1), \cdot)$ **4)** $(\{-1, 0, 1\}, \cdot)$ **5)** $((-\infty, 0), \cdot)$ **6)** $((0, \infty), \cdot)$ **7)** (\mathbb{C}, \cdot) **8)** $(\mathbb{Q} \setminus \{0\}, \cdot)$ **9)** $\left(\left\{\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}\right\}, \circ\right)$
- Zaokružiti brojeve ispred tvrdjenja koja su tačna u svakoj Bulovoj algebri $(B, +, \cdot', 0, 1)$ za sve $a, b \in B$:
1) $c + ab = (b + c)(a + c)$ **2)** $(ab)' = a' + b'$ **3)** $(aa)' = a' + a'$ **4)** $(a + b)' = a' + b'$
5) $(a + a)' = a' + a'$ **6)** $1 + 1 = 0$ **7)** $1 + a = 0'$ **8)** $1 + a = 1 \cdot a$
- Neka su funkcije $f : (0, \infty) \rightarrow (0, \infty)$ i $g : (0, \infty) \rightarrow (0, \infty)$ definisane sa $f(x) = \sqrt{x}$ i $g(x) = \ln(x + 1)$.
1) $f^{-1}(x) =$ **2)** $g^{-1}(x) =$ **3)** $(f \circ g)(x) =$ **4)** $(f \circ g)^{-1}(x) =$ **5)** $(g^{-1} \circ f^{-1})(x) =$
- $\arg\left(\frac{\pi}{2}\right) =$, $\arg(1 - i) =$, $\arg(-1 + i) =$, $\arg(i) =$, $\arg\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) =$, $\arg(\sqrt{3} + i) =$.
- Ako je $f(x) = 2^x$, tada je $f^{-1}(x) =$

* * * * *

- Odrediti realni i imaginarni deo, moduo, argument, i konjugovani broj kompleksnog broja $z = i + 2e^{-i\frac{\pi}{6}}$:
 $Re(z) =$, $Im(z) =$, $|z| =$, $\arg(z) =$, $\bar{z} =$, $z^{-1} =$.
- Da li postoji inverzna funkcija za $f(x) = \frac{2^x}{1+2^x}$? DA NE. Ako je DA tada je $f^{-1}(x) =$
- Ako je funkcija $y = f(x)$ definisana i injektivna za $x \in \mathbb{R}$, da li postoji inverzna funkcija f^{-1} ? DA NE
- Za svaku od datih relacija u skupu $A = \{1, 2, 3\}$ zaokružiti samo ona slova koja označavaju svojstvo relacije koju ona poseduje: R- refleksivnost S- simetričnost A- antisimetričnost T- tranzitivnost F- funkcija, a zatim zaokružiti brojeve ispred tačnih iskaza.

(relacija $\rho_1 \Leftrightarrow$ „nije manji od“) : R S A T F,

(relacija $\rho_3 \Leftrightarrow$ „deli“) : R S A T F,

$\rho_5 = \{(1, 3), (1, 2), (2, 1)\}$: R S A T F,

$\rho_7 = \emptyset$: R S A T F,

1) $\rho_1 = \rho_4$

2) $\rho_2 \cup \rho_6 = \rho_1$

3) $\rho_5 \cup \rho_6 \setminus \{(2, 1)\} = \rho_3$

(relacija $\rho_2 \Leftrightarrow$ „veći od“) : R S A T F,

$\rho_4 = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (3, 1), (3, 2), (2, 1)\}$: R S A T F,

$\rho_6 = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3)\}$: R S A T F,

$\rho_8 = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (2, 1)\}$: R S A T F.

4) $\rho_4 \cup \rho_8 \cup \{(2, 3), (1, 3)\} = A^2$

- Ako je $A = \{(\arg z + \arg z^{-1}) | z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}\}$ i $B = \{(\arg z - \arg(-z)) | z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}\}$ tada je: **1)** $A = \{0\}$ **2)** $A = \{2\pi\}$ **3)** $A = \{0, 2\pi\}$ **4)** $A = \{\pi\}$ **5)** $B = \{\pi\}$ **6)** $B = \{0, -\pi\}$ **7)** $B = \{0, \pi\}$ **8)** $B = \{\pi, -\pi\}$

- Bijektivne funkcije su: **1)** $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = e^x$ **2)** $f : (3, \infty) \rightarrow (1, \infty)$, $f(x) = \log_3 x$
3) $f : (-\infty, -2) \rightarrow (-\infty, 6)$, $f(x) = -x^2 - 4x$ **4)** $f : (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \arctg x$

- Ako je $z \in \mathbb{C}$ tada je (Upisi nedostajući element u šestočlanom skupu, u obliku $\rho e^{i\varphi}$, $\rho \geq 0$, $\varphi \in (-\pi, \pi]$)
 $z^6 = i \Leftrightarrow z \in \left\{ -\frac{1}{2}\sqrt{2+\sqrt{3}} - \frac{1}{2}i\sqrt{2-\sqrt{3}}, e^{-i\frac{7\pi}{12}}, \frac{1}{\sqrt{2}}(1-i), \frac{1}{2}\sqrt{2+\sqrt{3}} + \frac{1}{2}i\sqrt{2-\sqrt{3}}, \dots, \frac{1}{\sqrt{2}}(-1+i) \right\}$

- Ako je p polinom stepena 3 nad proizvoljnim poljem F tada: **1)** p je nesvodljiv nad F akko p ima korena u F **2)** ako p ima 3 korena u F onda je p svodljiv nad F **3)** ništa od prethodnog

- Normalizovani najveći zajednički delitelj za polinome $P(t) = 2(t-3)^7(t+2)^3(t-5)^5(t+17)^3$ i $Q(t) = 7(t-3)^2(t-15)(t-4)^3(t+2)^5$ je:

- Zaokružiti brojeve ispred algebarskih struktura koja su polja. **1)** $\left(\{f_k | f_k(x) = kx, k \in \mathbb{R}\}, +, \circ\right)$

2) $(\mathbb{R}^\mathbb{R}, +, \cdot)$ **3)** $(\mathbb{R}[t], +, \cdot)$ **4)** $(\mathbb{Z}_4, +, \cdot)$ **5)** $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$ **6)** $(\mathbb{Z}_3, +, \cdot)$ **7)** $\left(\{f | f : \mathbb{R} \xrightarrow{\text{nā}} \mathbb{R}\}, +, \circ\right)$

- Zaokružiti oznaku polja za koje važi da je polinom $t^3 + 2t + 1$ svodljiv nad njima. \mathbb{Q} \mathbb{R} \mathbb{C} \mathbb{Z}_3 \mathbb{Z}_5

- $f \in \mathbb{R}[x]$ i $f(1+3i) = 0$. Zaokružiti tačno: 1) $x - 1 - 3i \mid f(x)$ 2) $x - 1 + 3i \mid f(x)$ 3) $x + 1 - 3i \mid f(x)$
4) $x^2 - 2x + 10 \mid f(x)$; 5) $x^2 + 2x + 10 \mid f(x)$; 6) $x - \sqrt{10} e^{i \arctg 3} \mid f(x)$; 7) $x^2 + 2x - 10 \mid f(x)$.
- Zaokružiti broj (ili brojeve) ispred jednakosti koje su tačne u skupu kompleksnih brojeva:
1) $z\bar{z} = |z|^2$ 2) $\operatorname{Re}(z) = \frac{1}{2}(z - |\bar{z}|)$ 3) $|z_1 + z_2| \geq |z_1| + |z_2|$ 4) $\bar{z} \in \mathbb{R} \Rightarrow z = \bar{z}$
5) $\overline{z_1 \cdot z_2} = |\bar{z}_1| \cdot |\bar{z}_2|$ 6) $|\overline{z_1 \cdot z_2}| = |z_1| \cdot |z_2|$ 7) $z^2 |\bar{z}|^2 = z^3 \bar{z}$ 8) $z = e^{i\theta} \Rightarrow z^{-1} = \bar{z}, \theta \in \mathbb{R}$
- Zaokružiti brojeve ispred sirjektivnih funkcija:
1) $f : (0, \frac{\pi}{4}) \rightarrow (0, \infty), f(x) = \operatorname{tg} x$ 2) $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 3 - x$ 3) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2$
4) $f : \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty), f(x) = x^2$ 5) $f : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty), f(x) = x^2$ 6) $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \ln x$
- Zaokružiti broj (ili brojeve) ispred tvrđenja koja su tačna u svakom polju $(F, +, \cdot)$:
1) $a + bc = (a+b)(a+c)$ 2) $(F \setminus \{0\}, +)$ je grupa 3) (F, \cdot) je grupa 4) operacija $+$ je distributivna prema \cdot 5) $ab = 0 \Rightarrow a = 0 \vee b = 0$ 6) $a \neq 0 \wedge b \neq 0 \Rightarrow ab \neq 0$ 7) $a \cdot 0 = 0$ 8) $(F \setminus \{0\}, \cdot)$ je grupa
- Funkcija $f : (\frac{\pi}{6}, \frac{2\pi}{3}) \rightarrow (-1, 1)$ definisana sa $f(x) = \cos x$ je:
1) sirjektivna i nije injektivna
2) injektivna i nije sirjektivna
3) nije injektivna i nije sirjektivna
4) bijektivna
- Navesti geometrijsku interpretaciju skupova A, B, C, D, E i sledećih kompleksnih funkcija $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, $g : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, $h : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ i $s : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, kao i odgovoriti na pitanje injektivnosti i sirjektivnosti funkcija f, g, h i s .
 $f(z) = \frac{1}{2}\bar{z}(-1 + i\sqrt{3})$ je _____
 $g(z) = ze^{i\frac{\pi}{7}}$ je _____
 $h(z) = iI_m(z)$ je _____
 $s(z) = |z|e^{i\arg(-z)} \wedge s(0) = 0$ je _____
 $A = \{z ||z^7| = i^8\}$ je _____
 $B = \{z | z^7 = i^8\}$ je _____
 $C = \{z | z = -\bar{z}\}$ je _____
 $D = \{e^{i(\arg z + \arg(\bar{z}))} | z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}\}$ je _____
 $E = \{z | iI_m(z) = iR_e(z)\}$ je _____

- Neka je $\{2, -2\}$ skup **svih** korena polinoma $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$, gde su $a, b, c \in \mathbb{R}$. Tada skup svih mogućnosti za a je _____, skup svih mogućnosti za b je _____ i skup svih mogućnosti za c je _____.

- Ako je $A = \left\{ dg(P) \mid P(x) = ax^4 + bx^2 + cx, a, b, c \in \mathbb{R}, c \neq 0 \text{ i } dg(P) \text{ je stepen polinoma } P \right\}$, tada je:
1) $A = \{4\}$ 2) $A = \{4, 2\}$ 3) $A = \{0, 4, 2\}$ 4) $A = \{1, 2, 4\}$ 5) $A = \{0, 1, 2, 4\}$
- Za svako $z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ i sve $\varphi \in (-\pi, \pi]$ je:
1) $\overline{e^{-i\varphi}} = e^{-i\varphi}$ 2) $\overline{e^{-i\varphi}} = e^{i\varphi}$
3) $\arg z > 0 \Leftrightarrow \arg z - \arg(-z) = \pi$ 4) $\arg z < 0 \Leftrightarrow \arg z - \arg(-z) = -\pi$

- Zaokružiti brojeve koji su koreni odgovarajućih jednačina: $z^2 = \bar{z} : \{0, 1, e^{i\frac{2\pi}{3}}, e^{-i\frac{2\pi}{3}}\}$;
 $z^3 = |z| : \{0, 1, e^{i\frac{2\pi}{3}}, e^{-i\frac{2\pi}{3}}\}$, $z^4 = z : \{0, 1, e^{i\frac{2\pi}{3}}, e^{-i\frac{2\pi}{3}}\}$, $z^3 = 1 : \{0, 1, e^{i\frac{2\pi}{3}}, e^{-i\frac{2\pi}{3}}\}$.
- Neka je A najveći podskup od \mathbb{R} a B najmanji podskup skupa \mathbb{R} za koje je funkcija $f : A \rightarrow B$ definisana sa $f(x) = \ln(x^2 + 3)$. Tada $A =$ _____, $B =$ _____ Funkcija $f : A \rightarrow B$ je:
1) sirjektivna i neinjektivna 2) injektivna i nesirjektivna 3) ni injektivna ni sirjektivna 4) bijektivna
- Za kompleksni broj $z = e^{i\frac{\pi}{3}} + e^{-i\frac{\pi}{6}}$, naći:
 $R_e(z) =$ _____, $I_m(z) =$ _____, $|z| =$ _____, $\arg(z) =$ _____, $\bar{z} =$ _____, $z^2 =$ _____.

A ZADACI

1.12.2019.

- Neka je $A = \{a, b\}$, i neka je $*$ binarna operacija skupa $\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, A\}$ definisana sa
 $X * Y = \begin{cases} X \cup Y & , X \neq Y \\ \emptyset & , X = Y \end{cases}$. Ispitati sve aksiome komutativne grupe za uređeni par $(\mathcal{P}(A), *)$.
- Faktorisati polinom $a(x)$ nad poljima \mathbb{C} i \mathbb{R} i izračunati najveći zajednički delilac $c(x)$ polinoma $a(x) = x^4 - 6x^3 + 17x^2 - 28x + 20$ i $b(x) = x^4 - x^3 - 18x^2 + 52x - 40$.
- Ispitati da li Bulovi izrazi $I_1(x, y, z) = (xy' + x'z')(y + z')$ i $I_2(x, y, z) = (x + y'z + x'z')'$ određuju istu Bulovu funkciju na dvoelementnoj Bulovoj algebri.