

OSNOVNA PRAVILA, FORMULE I ZADACI IZ ANALITIČKE GEOMETRIJE

Jednačina prave p

$\overrightarrow{OM} = \vec{r} = \vec{r}_M$ označava da je $\vec{r} = \vec{r}_M$ predstavnik vektora čija početna tačka je koordinatni početak $O = O(0, 0, 0)$.

Neka je $\vec{r}_M = \vec{r} = (x, y, z)$ vektorska promenljiva i $A(x_1, y_1, z_1) \in p \parallel \vec{p} = (p_1, p_2, p_3)$. Tada je

$$M(x, y, z) \in p \Leftrightarrow \overrightarrow{AM} \parallel \vec{p} \Leftrightarrow \vec{r}_M - \vec{r}_A \parallel \vec{p} \Leftrightarrow \vec{r} - \vec{r}_A = t\vec{p}, \text{ odnosno } \boxed{p : \vec{r} = \vec{r}_A + t\vec{p}} \Leftrightarrow \boxed{p : \frac{x-x_1}{p_1} = \frac{y-y_1}{p_2} = \frac{z-z_1}{p_3} = t}$$

$$\Leftrightarrow \boxed{p : x = x_1 + tp_1 \wedge y = y_1 + tp_2 \wedge z = z_1 + tp_3} \Leftrightarrow \boxed{p : (\vec{r} - \vec{r}_A) \times \vec{p} = 0} \Leftrightarrow \boxed{p : \vec{r} \times \vec{p} = \vec{r}_A \times \vec{p}}$$

Jednačina ravni α

Neka je $\vec{r}_M = \vec{r} = (x, y, z)$ vektorska promenljiva i $Q(x_1, y_1, z_1) \in \alpha \perp \vec{n} = (A, B, C) = A\vec{i} + B\vec{j} + C\vec{k}$. Tada je

$$M(x, y, z) \in \alpha \Leftrightarrow \overrightarrow{QM} \perp \vec{n} \Leftrightarrow \overrightarrow{QM} \cdot \vec{n} = 0 \Leftrightarrow (\vec{r}_M - \vec{r}_Q) \cdot \vec{n} = 0 \Leftrightarrow \vec{n} \cdot \vec{r} = \vec{n} \cdot \vec{r}_Q \Leftrightarrow Ax + By + Cz + D = 0,$$

$\Leftrightarrow \boxed{A(x - x_1) + B(y - y_1) + C(z - z_1) = 0}$ gde je $\vec{n} = A\vec{i} + B\vec{j} + C\vec{k} = (A, B, C)$ vektor normalan na ravan α , Q proizvoljna fiksna tačka ravni α , \vec{r} promenljivi (tekući) vektor čiji vrh uvek pripada ravni α ako mu je početak u tački $O(0, 0, 0)$, A, B, C, D su realni brojevi za koje važi da je $A^2 + B^2 + C^2 \neq 0$ i $D = -\vec{n} \cdot \vec{r}_Q$.

Normalna projekcija vektora \vec{x} na pravac vektora \vec{a} je vektor $\text{pr}_{\vec{a}}(\vec{x}) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{x}}{|\vec{a}|^2} \vec{a} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{x}}{|\vec{a}|} \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$ ($|\text{pr}_{\vec{a}}(\vec{x})| = \frac{|\vec{a} \cdot \vec{x}|}{|\vec{a}|}$)

Normalna algebarska projekcija vektora \vec{x} na pravac vektora \vec{a} je skalar (broj) $\pm |\text{pr}_{\vec{a}}(\vec{x})| = \frac{\vec{a} \cdot \vec{x}}{|\vec{a}|}$

Za $|\vec{q}| = 1$, $\text{pr}_{\vec{q}}(\vec{x}) = (\vec{q} \cdot \vec{x})\vec{q}$, a algebarska projekcija na pravac vektora \vec{q} je $\vec{q} \cdot \vec{x}$.

Za svaki vektor \vec{a} koji ima isti pravac kao i vektor \vec{b} , važi da je $\vec{a} = \pm |\vec{a}| \frac{\vec{b}}{|\vec{b}|}$, gde se uzima znak + ako su vektori \vec{a} i \vec{b} istog smera i znak – ako su suprotnog smera. **Drugim rečima, svaki vektor se može napisati kao njegov intezitet puta jedinični vektor njegovoga pravca.**

Deoba duži u dатој razmeri Ako je $\overrightarrow{AM} = \lambda \overrightarrow{MB}$ ($\lambda : 1 = AM : MB$), tada je $\vec{r}_M = \frac{\vec{r}_A + \lambda \vec{r}_B}{1 + \lambda}$.

Prodor prave kroz ravan

Zajednička tačka P ravni $\alpha : \vec{n} \cdot \vec{r} = \vec{n} \cdot \vec{r}_Q$ i prave $a : \vec{r} = \vec{r}_A + t\vec{a}$ dobija se tako što $\vec{r} = \vec{r}_A + t\vec{a}$ uvrstimo u $\vec{n} \cdot \vec{r} = \vec{n} \cdot \vec{r}_Q$ i rešimo dobijenu jednačinu po t . Tako dobijamo da je $t = \frac{(\vec{r}_Q - \vec{r}_A) \cdot \vec{n}}{\vec{a} \cdot \vec{n}}$. Ako sada tako dobijeno t uvrstimo u $\vec{r} = \vec{r}_A + t\vec{a}$, tada promenljivi (tekući) vektor \vec{r} postaje \vec{r}_P , pa sledi da formula za \vec{r}_P tj. za prodor P , prave $a : \vec{r} = \vec{r}_A + t\vec{a}$ kroz ravan $\alpha : \vec{n} \cdot \vec{r} = \vec{n} \cdot \vec{r}_Q$ tj. $\{P\} = \alpha \cap a$ je $\boxed{\vec{r}_P = \vec{r}_A + \frac{(\vec{r}_Q - \vec{r}_A) \cdot \vec{n}}{\vec{a} \cdot \vec{n}} \vec{a}}$.

Sve projekcije i kose i ortogonalne (normalne), na pravu i na ravan, dobijaju se kao posledice formule prodora!

Svaki vektor $\vec{x} \neq 0$ može se na jedinstven način napisati kao zbir vektora \vec{p} i \vec{q} tako da je \vec{p} paralelan sa datom pravom $a : \vec{r} = \vec{r}_A + t\vec{a}$ i \vec{q} paralelan sa datom ravnim $\pi : \vec{n} \cdot \vec{r} = \vec{n} \cdot \vec{r}_Q$ i ako je $a \not\parallel \pi$. Tada mora biti $\vec{p} = \text{pr}_{\vec{a}, \pi}(\vec{x}) = \frac{\vec{n} \cdot \vec{x}}{\vec{n} \cdot \vec{a}} \vec{a}$ i $\vec{q} = \text{pr}_{\pi, \vec{a}}(\vec{x}) = \vec{x} - \frac{\vec{n} \cdot \vec{x}}{\vec{n} \cdot \vec{a}} \vec{a}$, gde $\text{pr}_{\pi, \vec{a}}(\vec{x})$ zovemo projekcija vektora \vec{x} na ravan π u pravcu vektora \vec{a} i $\text{pr}_{\vec{a}, \pi}(\vec{x})$ zovemo projekcija vektora \vec{x} na pravac vektora \vec{a} u „prvcu ravni π ” tj.

$\text{pr}_{\vec{a}, \pi}(\vec{x})$ je kosa projekcija vektora \vec{x} na pravac vektora \vec{a} u „prvcu ravni π ”.

$\text{pr}_{\pi, \vec{a}}(\vec{x})$ je kosa projekcija vektora \vec{x} na ravan π u prvcu vektora \vec{a} .

Projekcija (ortogonalna) tačke na pravu

Neka je prava a određena tačkom A koja joj pripada i vektorom \vec{a} sa kojim je paralelna. Projekcija M' tačke M na pravu $a : \vec{r} = \vec{r}_A + t\vec{a}$ dobija se tako što postavimo ravan α kroz tačku M normalno na na pravu a i tražimo prodor parave a kroz ravan α po prethodnoj formuli. Tako dobijamo da je $\boxed{\vec{r}_{M'} = \vec{r}_A + \frac{(\vec{r}_M - \vec{r}_A) \cdot \vec{a}}{\vec{a} \cdot \vec{a}} \vec{a}}$.

Projekcija (ortogonalna) tačke na ravan

Projekcija M' tačke M na ravan $\alpha : \vec{n} \cdot \vec{r} = \vec{n} \cdot \vec{r}_Q$ dobija se tako što kroz tačku M postavimo pravu normalnu na ravan α i prodorna tačka te prave kroz ravan α biće tražena tačka $M' : \boxed{\vec{r}_{M'} = \vec{r}_M + \frac{(\vec{r}_Q - \vec{r}_M) \cdot \vec{n}}{\vec{n} \cdot \vec{n}} \vec{n}}$.

Osnovna pravila za rešavanje zadataka iz analitičke geometrije.

1. Jedinični vektor bilo kojega pravca (ili prave p) se dobija kada **bilo koji** vektor \vec{p} paralelan sa pravom (pravcem) p , podelimo sa njegovim sopstvenim intezitetom tj. jedinični vektor je $\frac{\vec{p}}{|\vec{p}|}$.
2. **Svaki** vektor je proizvod njegovog inteziteta i jediničnog vektora paralelnog i istog smera sa njim.
3. U većini zadataka, **potreban vektor** u rešavanju, **dobija se kao vektorski proizvod neka dva data nekolinearna vektora koji su oba normalna na traženi vektor.**
4. Dati su vektori $\vec{r}_A, \vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ i realni brojevi $|\overrightarrow{AB}| = d_1, |\overrightarrow{BC}| = d_2$ i $|\overrightarrow{CD}| = d_3$, tako da je $\vec{a} \parallel AB, \vec{b} \parallel BC$ i $\vec{c} \parallel CD$. Tada \vec{r}_D izražen u zavisnosti od datoga je $\vec{r}_D = \vec{r}_A \pm d_1 \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} \pm d_2 \frac{\vec{b}}{|\vec{b}|} \pm d_3 \frac{\vec{c}}{|\vec{c}|}$, gde se ispred sabiraka uzimaju znaci + ako su vektori $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ istog smera sa redom vektorima $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BC}, \overrightarrow{CD}$, a u suprotnom znaci –

Primeri:

1. Odrediti temena A i B jednakostraničnog trougla ABO , gde tačke A i B pripadaju pravoj $p : \vec{r} = \vec{r}_P + t\vec{p}$ i $O(0, 0, 0) \notin p$. **Rešenje:** Neka je S projekcija koordinatnog početka $O(0, 0, 0)$ na pravu p . Tada je $\vec{r}_S = \vec{r}_P + \frac{((0,0,0)-\vec{r}_P)\vec{p}}{\vec{p}\vec{p}}\vec{p} = \vec{r}_P - \frac{\vec{r}_P\vec{p}}{\vec{p}\vec{p}}\vec{p}$ i $\vec{r}_{A,B} = \vec{r}_S \pm \frac{|\vec{r}_S|}{\sqrt{3}}\frac{\vec{p}}{|\vec{p}|}$

1A. Odrediti temena A, B i C kvadrata $OABC$, ako A i B pripadaju pravoj $p : \vec{r} = (-9, -9, 0) + t(8, 1, 4)$, $\vec{r}_A \perp p$ i $\overrightarrow{AB} \cdot (8, 1, 4) > 0$. **Rešenje:** Tačka A je projekcija koordinatnog početka $O(0, 0, 0)$ na pravu p , pa je $\vec{r}_A = (-9, -9, 0) + \frac{((0,0,0)-(-9,-9,0))(8,1,4)}{(8,1,4)(8,1,4)}(8, 1, 4) = (-1, -8, 4)$, $\vec{r}_B = \vec{r}_A + |\vec{r}_A| \frac{(8,1,4)}{|(8,1,4)|} = (7, -7, 8)$ i $\vec{r}_C = (8, 1, 4)$.

1B. Izraziti vektore položaja \vec{r}_A, \vec{r}_C i \vec{r}_B temena A, C i B kvadrata $OACB$ u zavisnosti od $\vec{r}_P = (-17, -10, -4)$ i $\vec{p} = (-8, -1, -4)$, ako dijagonala AB pripada pravoj $p : \vec{r} = \vec{r}_P + t\vec{p}$. **Rešenje:**

Presek S dijagonala OC i AB kvadrata $OACB$ je projekcija koordinatnog početka $O(0, 0, 0)$ na pravu p ,

$$\vec{r}_S = \vec{r}_P + \frac{(\vec{r}_O - \vec{r}_P)\vec{p}}{\vec{p}\vec{p}}\vec{p} = (-17, -10, -4) + \frac{((0,0,0)-(-17,-10,-4))(-8,-1,-4)}{(-8,-1,-4)(-8,-1,-4)}(-8, -1, -4) = (-1, -8, 4),$$

$$\vec{r}_{A,B} = \vec{r}_S \pm |\vec{r}_S| \frac{(-8, -1, -4)}{|(-8, -1, -4)|} = , \text{ pa je } \vec{r}_A = (7, -7, 8), \vec{r}_B = (-9, -9, 0) \text{ i } \vec{r}_C = 2\vec{r}_S = \vec{r}_A + \vec{r}_B - \vec{r}_O = (-2, -16, 8).$$

2. Odrediti \vec{r}_C u zavisnosti od \vec{r}_A i \vec{r}_B , tako da trougao ABC bude jednakostraničan i da tačke $OABC$ budu komplanarne, gde je O koordinatni početak. **Rešenje:** $\vec{r}_C = \frac{1}{2}(\vec{r}_A + \vec{r}_B) \pm \frac{\sqrt{3}}{2}|\overrightarrow{AB}|\frac{\vec{d}}{|\vec{d}|}$, gde je $\vec{d} = (\vec{r}_A \times \overrightarrow{AB}) \times \overrightarrow{AB}$

3. Odrediti \vec{r}_C i \vec{r}_D u zavisnosti od \vec{r}_A i \vec{r}_B , tako da ravan kvadrata $ABCD$ sadrži $O(0, 0, 0)$. **Rešenje:**

$$\vec{r}_C = \vec{r}_B \pm |\overrightarrow{AB}|\frac{\vec{d}}{|\vec{d}|} \text{ i } \vec{r}_D = \vec{r}_A \pm |\overrightarrow{AB}|\frac{\vec{d}}{|\vec{d}|}, \text{ gde je } \vec{d} = (\vec{r}_A \times \overrightarrow{AB}) \times \overrightarrow{AB} \text{ i } \overrightarrow{AB} = \vec{r}_B - \vec{r}_A$$

4. Neka je ravan α definisana sa $\alpha : \vec{n}\vec{r} = \vec{n}\vec{r}_Q$ i neka su tačke A i C određene sa svojim vektorima položaja \vec{r}_A i \vec{r}_C , tako da je $\overrightarrow{AC} \nparallel \vec{n}$. U zavisnosti od vektora $\vec{n}, \vec{r}_Q, \vec{r}_A$ i \vec{r}_C izraziti vektore položaja tačaka B i D temena kvadrata $ABCD$, gde je AC njegova dijagonala i ravan kvadrata $ABCD$ normalna na ravan α .

Rešenje: Neka je β ravan kvadrata $ABCD$ tj. normalna na α i prolazi kroz AC . Tada vektor normale ravni β je $\vec{n}_\beta = \overrightarrow{AC} \times \vec{n}$ i vektor paralelan sa BD je $\vec{d} = \overrightarrow{AC} \times (\overrightarrow{AC} \times \vec{n})$, pa je $\vec{r}_{B,D} = \frac{1}{2}(\vec{r}_A + \vec{r}_C) \pm \frac{1}{2}|\vec{r}_A - \vec{r}_C|\frac{\vec{d}}{|\vec{d}|}$.

5. Ravan α sadrži tačku Q i normalna je na vektor \vec{n} , a prava p sadrži tačku P i paralelna je sa vektorom \vec{p} , pri čemu je $p \nparallel \alpha$ i $Q \notin p$. U funkciji od $\vec{r}_Q, \vec{n}, \vec{r}_P$ i \vec{p} izraziti temena A, B, C jednakostraničnog trougla ABC ivice 1, čija sva temena leže u ravni α , težište T trougla pripada i pravoj p , a teme A je maksimalno udaljeno od tačke Q .

Rešenje: Težište T trougla je presek prave p i ravni α , te je $\vec{r}_T = \vec{r}_P + \frac{(\vec{r}_Q - \vec{r}_P) \cdot \vec{n}}{\vec{n} \cdot \vec{p}}\vec{p}$. Ako je A_1 sredina stranice BC , tada je $TA = \frac{2\sqrt{3}}{3} = \frac{1}{\sqrt{3}}$ i $TA_1 = \frac{1}{2\sqrt{3}}$. Kako je teme A je maksimalno udaljeno od tačke Q , sledi da su

$$A, Q, T \text{ kolinearne i } T \text{ je između } A \text{ i } Q, \text{ pa je } \vec{r}_A = \vec{r}_T + \frac{1}{\sqrt{3}}\frac{\overrightarrow{QT}}{|\overrightarrow{QT}|}, \vec{r}_{A_1} = \vec{r}_T + \frac{1}{2\sqrt{3}}\frac{\overrightarrow{TQ}}{|\overrightarrow{TQ}|}, \vec{r}_{B,C} = \vec{r}_{A_1} \pm \frac{1}{2}\frac{\overrightarrow{AT} \times \vec{n}}{|\overrightarrow{AT} \times \vec{n}|}.$$

6*. Neka su mimoilazne prave a i b određene redom svojim jednačinama $\vec{r} = \vec{r}_A + t\vec{a}$ i $\vec{r} = \vec{r}_B + t\vec{b}$ i neka je $\vec{a} \perp \vec{b}$ tj. $\vec{a}\vec{b} = 0$. **(a)** Naći vektore položaja temena pravilnog tetraedra $MNPQ$ u zavisnosti od $\vec{r}_A, \vec{a}, \vec{r}_B, \vec{b}$, ako se temena nalaze na pravama a i b . **(b)** Izračunati koordinate temena M, N, P, Q tetraedra ako je $\vec{r}_A = (-4, 1, 4), \vec{a} = (1, 1, 0), \vec{r}_B = (-7, 11, -15), \vec{b} = (-7, 7, -8)$.

Rešenje (a) Neka ravan α sadrži pravu a i neka je normalna na pravu b . Takva ravan α postoji samo zato što je $a \perp b$. Presečna tačka prave b i ravni α je tačka S čiji vektor položaja je $\vec{r}_S = \vec{r}_B + \frac{(\vec{r}_A - \vec{r}_B)\vec{b}}{\vec{b}\vec{b}}\vec{b}$. Ako zamenimo uloge pravama a i b u predhodnom računanju dobija se tačka $\vec{r}_T = \vec{r}_A + \frac{(\vec{r}_B - \vec{r}_A)\vec{a}}{\vec{a}\vec{a}}\vec{a}$. Znači da je ST zajednička normala pravih a i b , pri čemu je $S \in b$ i $T \in a$. Sada je dalje očevidno $\vec{r}_{M,N} = \vec{r}_T \pm |\vec{r}_T - \vec{r}_S| \frac{\sqrt{2}}{2} \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$ i $\vec{r}_{P,Q} = \vec{r}_S \pm |\vec{r}_T - \vec{r}_S| \frac{\sqrt{2}}{2} \frac{\vec{b}}{|\vec{b}|}$. **(b)** $\vec{r}_T = (-\frac{1}{2}, \frac{9}{2}, 4), \vec{r}_S = (\frac{7}{2}, \frac{1}{2}, -3), \vec{r}_M = (4, 9, 4), \vec{r}_N = (-5, 0, 4), \vec{r}_P = (0, 4, 1), \vec{r}_Q = (7, -3, 7)$.

7. Neka ravan $\alpha : \vec{n}\vec{r} = \vec{n}\vec{r}_Q$ nije normalna na z -osu i neka tačka $A \notin \alpha$ je određena sa \vec{r}_A . U zavisnosti od $\vec{r}_Q, \vec{r}_A, \vec{n}$ izraziti $\vec{r}_B, \vec{r}_C, \vec{r}_D$ tako da je $ABCD$ kvadrat, $AB \perp \alpha$, $B \in \alpha$ i BC paralelno sa xOy ravnji.

Rešenje $\vec{r}_B = \vec{r}_A + \frac{(\vec{r}_Q - \vec{r}_A)\vec{n}}{\vec{n}\vec{n}}\vec{n}, \vec{r}_C = \vec{r}_B \pm |\overrightarrow{AB}|\frac{\vec{n} \times \vec{k}}{|\vec{n} \times \vec{k}|}, \text{ gde je } \overrightarrow{AB} = \vec{r}_B - \vec{r}_A \text{ i } \vec{k} = (1, 0, 0)$.

8. Dokazati da je trougao ABC jednakostraničan ako i samo ako važi $2\vec{r}_C - \vec{r}_A - \vec{r}_B = \pm\sqrt{3}\vec{n} \times (\vec{r}_B - \vec{r}_A)$, gde je vektor \vec{n} jedinični vektor i normalan na ravan trougla ABC tj. $\vec{n} = \frac{\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}|}$.

9. Neka tačka V određena sa vektorom položaja \vec{r}_V ne pripada pravoj $p : \vec{r} = \vec{r}_P + t\vec{p}$. U zavisnosti od \vec{r}_V, \vec{r}_P i \vec{p} naći vektore položaja $\vec{r}_A, \vec{r}_B, \vec{r}_C$ i \vec{r}_D temena prave pravilne četvorostruke piramide $VABCD$, ako temena A i C pripadaju pravoj p i dijagonala AC osnove $ABCD$ je jednaka visini piramide.

Rešenje Neka je tačka T projekcija tačke V na pravu p . Tada je

$$\vec{r}_T = \vec{r}_P + \frac{(\vec{r}_V - \vec{r}_P)\vec{p}}{\vec{p}\vec{p}}\vec{p} \quad \vec{r}_{A,C} = \vec{r}_T \pm \frac{1}{2}|\vec{r}_V - \vec{r}_T| \frac{\vec{p}}{|\vec{p}|} \quad \vec{r}_{B,D} = \vec{r}_T \pm \frac{1}{2}|\vec{r}_V - \vec{r}_T| \frac{(\vec{r}_V - \vec{r}_T) \times \vec{p}}{|(\vec{r}_V - \vec{r}_T) \times \vec{p}|}.$$

10. Neka tačka V ne pripada pravoj $p : \vec{r} = \vec{r}_P + t\vec{p}$. U zavisnosti od \vec{r}_V, \vec{r}_P i \vec{p} naći vektore položaja $\vec{r}_A, \vec{r}_B, \vec{r}_C$ temena pravilnog tetraedra $VABC$, ako $A \in p$ i $T \in p$, gde je T težište trougla ABC .

Rešenje Neka je tačka T projekcija tačke V na pravu p i S sredina od BC . Tada je

$$\vec{r}_T = \vec{r}_P + \frac{(\vec{r}_V - \vec{r}_P)\vec{p}}{\vec{p}\vec{p}}\vec{p}, \quad \vec{r}_A = \vec{r}_T \pm \frac{\sqrt{2}}{2}|\vec{r}_V - \vec{r}_T| \frac{\vec{p}}{|\vec{p}|}, \quad \vec{r}_S = \vec{r}_T \mp \frac{\sqrt{2}}{4}|\vec{r}_V - \vec{r}_T| \frac{\vec{p}}{|\vec{p}|}, \quad \vec{r}_{B,C} = \vec{r}_S \pm \frac{1}{2}\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}|\vec{r}_V - \vec{r}_T| \frac{(\vec{r}_V - \vec{r}_T) \times \vec{p}}{|(\vec{r}_V - \vec{r}_T) \times \vec{p}|}.$$

11. U zavisnosti od \vec{r}_A i \vec{n} napisati vektore položaja temena B, C, D kvadrata $ABCD$ koji pripada ravni α koja je normalna na jedinični vektor \vec{n} i sadrži tačku A , a teme C je najbliže kordinatnom početku.

Rešenje Tačka C je normalna projekcija koordinatnog početka O na ravan α , pa je

$$\vec{r}_C = \frac{\vec{r}_A \vec{n}}{\vec{n} \vec{n}} \vec{n}, \quad \vec{r}_{B,D} = \frac{1}{2}(\vec{r}_A + \vec{r}_C) \pm \frac{1}{2}|\overrightarrow{AC}| \frac{\vec{n} \times \overrightarrow{AC}}{|\vec{n} \times \overrightarrow{AC}|} = \frac{1}{2}(\vec{r}_A + \vec{r}_C) \pm \frac{1}{2}|\overrightarrow{AC}| \frac{\vec{n} \times \overrightarrow{AC}}{|\vec{n}| |\overrightarrow{AC}|} = \frac{1}{2}(\vec{r}_A + \vec{r}_C \pm \vec{n} \times \overrightarrow{AC}).$$

12. Neka dатој ravni $\alpha : \vec{n}\vec{r} = \vec{n}\vec{r}_Q$ pripada kvadratna osnova $ABCD$ prave pravilne četvorostrane piramide $VABCD$, где je V dati vrh piramide i T težište osnove $ABCD$. U zavisnosti od \vec{n}, \vec{r}_V i \vec{r}_Q , izraziti vektore položaja temena $ABCD$, ako je teme A kolinearno sa koordinatnim početkom O i tačkom $V \notin \alpha$.

Rešenje T je projekcija tačke V na ravan α , a tačku A presek prave $p = p(O, V)$ i ravni α odnosno $\vec{r}_T = \vec{r}_V + \frac{(\vec{r}_Q - \vec{r}_V)\vec{n}}{\vec{n}\vec{n}}\vec{n}$ i $\vec{r}_A = \vec{r}_V + \frac{(\vec{r}_Q - \vec{r}_V)\vec{n}}{\vec{r}_V \vec{n}}\vec{r}_V$. Dalje je $\vec{r}_C = 2\vec{r}_T - \vec{r}_A$ i $\vec{r}_{B,D} = \vec{r}_T \pm |\vec{r}_T - \vec{r}_A| \cdot \frac{(\vec{r}_A - \vec{r}_T) \times \vec{n}}{|(\vec{r}_A - \vec{r}_T) \times \vec{n}|}$.

13. Data je prava $p : \vec{r} = \vec{r}_P + t\vec{p}$ i vektor $\vec{n} \not\parallel \vec{p}$. **(a)** Odrediti temena pravilnog šestougla $ABCDEF$ čije teme A pripada pravoj p , centar je koordinatni početak O i ravan šestougla je normalna na \vec{n} . **(b)** Za $\vec{r}_P = (5, 5, 8), \vec{p} = (-3, 1, 1)$ i $\vec{n} = (-3, 0, 20)$ izračunati koordinate tačke A . **Rešenje (a)** Jednačina ravni α šestougla je $\alpha : \vec{n}\vec{r} = 0$. Pa je $A = \alpha \cap p$, odnosno $\vec{r}_A = \vec{r}_P + \frac{(\vec{r}_P - \vec{r}_A)\vec{n}}{\vec{n}\vec{p}}\vec{p}$. Iz $\overrightarrow{OA} = -\overrightarrow{OD}$ sledi $\vec{r}_D = -\vec{r}_A$. Neka je Q projekcija tačke B i tačke F na duž AO , a R projekcija tačke C i tačke E na duž OD . Tada je $\vec{r}_Q = \frac{1}{2}\vec{r}_A$ i $\vec{r}_R = \frac{1}{2}\vec{r}_D$. Vektori $\overrightarrow{QB}, \overrightarrow{QF}, \overrightarrow{RC}$ i \overrightarrow{RE} su normalni i na \vec{n} i na $\vec{r}_A \parallel \overrightarrow{AD}$, tj. paralelni su sa $\vec{m} = \vec{r}_A \times \vec{n}$, te je $\vec{r}_{B,F} = \vec{r}_Q \pm \frac{\sqrt{3}}{2}|\vec{r}_A| \frac{|\vec{m}|}{|\vec{m}|}$ i $\vec{r}_{C,E} = \vec{r}_R \pm \frac{\sqrt{3}}{2}|\vec{r}_A| \frac{|\vec{m}|}{|\vec{m}|}$. **(b)** Uvrštavanjem datih vektora dobijamo $\vec{r}_A = (20, 0, 3)$.

14. Data je ravan $\alpha : \vec{n}\vec{r} = \vec{n}\vec{r}_Q$ i prava $a : \vec{r} = \vec{r}_L + t\vec{l}$, pri čemu je $\vec{l}\vec{n} \neq 0$ i $\vec{l} \times \vec{n} \neq 0$. U zavisnosti od $\vec{r}_L, \vec{r}_Q, \vec{l}$ i \vec{n} odrediti vektore položaja temena kocke $ABCDA_1B_1C_1D_1$ ivice dužine 5, ako teme A pripada preseku prave i ravni, teme B pripada pravi i ravan kvadrata $ABCD$ je normalna na ravan α . Koliko ima rešenja?

Rešenje A je prodor prave a kroz α , te je $\vec{r}_A = \vec{r}_L + \frac{(\vec{r}_Q - \vec{r}_L)\vec{n}}{\vec{l}\vec{n}}\vec{l}$, a zbog $B \in a$ sledi $\vec{r}_B = \vec{r}_A \pm 5\frac{\vec{l}}{|\vec{l}|}$. Vektor \vec{m} normale ravni kvadrata $ABCD$ mora biti normalan i na \vec{n} i na \vec{l} , te je $\vec{m} = \vec{n} \times \vec{l}$, a vektori \overrightarrow{AD} i \overrightarrow{BC} moraju biti paralelni sa $\vec{p} = \vec{m} \times \vec{l}$, te je $\vec{r}_D = \vec{r}_A \pm 5\frac{\vec{p}}{|\vec{p}|}$ i $\vec{r}_C = \vec{r}_B \pm 5\frac{\vec{p}}{|\vec{p}|}$. $\vec{r}_{A_1,B_1,C_1,D_1} = \vec{r}_{A,B,C,D} \pm 5\frac{|\vec{m}|}{|\vec{m}|}$. Ima 8 rešenja.

15*. Date su tačke A i C i vektor \vec{n} normalan na ravan pravougaonika $ABCD$ čiji odnos stranica je $\sqrt{2}$. Odrediti \vec{r}_B i \vec{r}_D u zavisnosti od \vec{r}_A, \vec{r}_C i \vec{n} . **Rešenje** Neka je npr. $AB : BC = \sqrt{2} : 1$ tj. $AB = \sqrt{2}BC$, i neka je tačka Q projekcija tačke B na duž AC . Iz sličnosti trouglova ABC i BQC sledi da je $\frac{BC}{AC} = \frac{QC}{BC}$, odakle sledi da je $QC = \frac{BC^2}{AC}$, gde je $AC^2 = AB^2 + BC^2 = 2BC^2 + BC^2 = 3BC^2$ odnosno $BC^2 = \frac{1}{3}AC^2$, odakle sledi $QC = \frac{\frac{1}{3}AC^2}{AC} = \frac{1}{3}AC$. Sledi $\vec{r}_Q = \vec{r}_C + \frac{1}{3}\overrightarrow{CA} = \frac{1}{3}\vec{r}_A + \frac{2}{3}\vec{r}_C$. Kako je $QB = \sqrt{BC^2 - QC^2} = \sqrt{\frac{1}{3}AC^2 - \frac{1}{9}AC^2} = \frac{\sqrt{2}}{3}AC$, sledi da je $\vec{r}_{B,D_1} = \vec{r}_Q + \overrightarrow{QB} = \vec{r}_Q \pm \frac{\sqrt{2}}{3} \left| \overrightarrow{AC} \right| \frac{\overrightarrow{AC} \times \vec{n}}{\left| \overrightarrow{AC} \times \vec{n} \right|}$. Iz $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{BA}$ sledi $\vec{r}_{D,B_1} = \vec{r}_A - \vec{r}_B + \vec{r}_C$.

Za $AB : BC = \sqrt{2} : 1$ rešenje je A, B, C, D , a za $AB : BC = 1 : \sqrt{2}$ rešenje je A, B_1, C, D_1 .

16. Data je prava $p : \vec{r} = \vec{r}_P + t\vec{p}$ i tačka $A \notin p$. U zavisnosti od vektora \vec{r}_A, \vec{r}_P i \vec{p} izraziti vektore položaja temena kocke $ABCDA_1B_1C_1D_1$, tako da dijagonalala BD osnove $ABCD$ pripada pravoj p . **Rešenje:** Tačku S , presek dijagonalala kvadrata $ABCD$, dobijamo kao projekciju tačke A na pravu p tj. $\vec{r}_S = \vec{r}_P + \frac{(\vec{r}_A - \vec{r}_P)\vec{p}}{\vec{p}\vec{p}}\vec{p}$. Dalje sledi da je $\vec{r}_{B,D} = \vec{r}_S \pm \left| \overrightarrow{AS} \right| \frac{\vec{p}}{|\vec{p}|}$, pa iz $\overrightarrow{AS} = \overrightarrow{SC}$ dobijamo $\vec{r}_C = 2\vec{r}_S - \vec{r}_A$. Kako je $\vec{n} = \frac{\vec{p} \times \overrightarrow{AC}}{|\vec{p} \times \overrightarrow{AC}|}$ jedinični vektor normale ravni $ABCD$, sledi $\vec{r}_{A_1,B_1,C_1,D_1} = \vec{r}_{A,B,C,D} \pm \left| \overrightarrow{AB} \right| \vec{n}$. Ima dva rešenja!

17*. Data je ravan $\alpha : \vec{n}\vec{r} = \vec{n}\vec{r}_Q$, prava $p : \vec{r} = \vec{r}_P + t\vec{p}$, tačka $A, p \not\parallel \alpha, A \notin p$ i $A \notin \alpha$. U zavisnosti od $\vec{n}, \vec{p}, \vec{r}_A, \vec{r}_Q$ i \vec{r}_P izraziti vektore položaja temena jednakokrakog trougla ABC čije teme B pripada pravoj p , teme C pripada ravni α i stranica AB je osnovica trougla koja je paralelna sa ravni α pri čemu ravan trougla ABC zaklapa sa ravni α ugao od $\frac{\pi}{4}$. **Rešenje** Iz $B \in p$ i $AB \parallel \alpha$ sledi da tačku B možemo dobiti kao prodor prave p kroz ravan koja sadrži tačku A i paralelna je sa α , pa je $\vec{r}_B = \vec{r}_P + \frac{(\vec{r}_A - \vec{r}_P)\vec{n}}{\vec{p}\vec{n}}\vec{p}$. Ako je S sredina duži AB tada je $\vec{r}_S = \frac{1}{2}(\vec{r}_A + \vec{r}_B)$. Ako je tačka T projekcija tačke S na ravan α , tada je $\vec{r}_T = \vec{r}_S + \frac{(\vec{r}_Q - \vec{r}_S)\vec{n}}{\vec{n}\vec{n}}\vec{n}$. Kako je ABC jednakokraki trougao sa kracima AC i BC , teme C treba, osim ravni α , da pripada i simetralnoj ravni osnovice AB , odnosno treba da pripada pravoj m koja leži u ravni α , sadrži tačku T , a pravac joj je normalan na pravac prave AB . Vektor pravca prave m je $\vec{m} = \vec{n} \times \overrightarrow{AB}$. Iz uslova da ravan trougla treba sa

ravni α da zaklapa ugao $\frac{\pi}{4}$ sledi da je STC jednakokraki pravougli trougao sa pravim uglom kod temena T , što znači da je $ST = TC$, te tako dobijamo $\vec{r}_{C_{1,2}} = \vec{r}_T \pm |\overrightarrow{ST}| \frac{\vec{m}}{|\vec{m}|}$.

18. U zavisnosti od vektora \vec{n} i vektora položaja \vec{r}_A i \vec{r}_B susednih temena A i B kocke $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$, izraziti vektore položaja temena kocke $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ kod koje je ravan dijagonalnog preseka $ABC_1 D_1$ normalna na vektor \vec{n} . **Rešenje** Kako su $\overrightarrow{BC_1}$ i $\overrightarrow{AD_1}$ vektori dijagonala kvadrata omotača kocke normalni na vektore \vec{n} i \overrightarrow{AB} , sledi $\vec{r}_{C_{1,D_1}} = \vec{r}_{B,A} \pm \sqrt{2} |\overrightarrow{AB}| \frac{\overrightarrow{AB} \times \vec{n}}{|\overrightarrow{AB} \times \vec{n}|}$. Tačke $\vec{r}_S = \frac{1}{2}(\vec{r}_{C_1} + \vec{r}_B)$ i $\vec{r}_T = \frac{1}{2}(\vec{r}_{D_1} + \vec{r}_A)$ su sredine duži BC_1 i AD_1 , te sledi da je $\vec{r}_{B_1,C} = \vec{r}_S \pm \frac{\sqrt{2}}{2} |\overrightarrow{AB}| \frac{\vec{n}}{|\vec{n}|}$ i $\vec{r}_{A_1,D} = \vec{r}_T \pm \frac{\sqrt{2}}{2} |\overrightarrow{AB}| \frac{\vec{n}}{|\vec{n}|}$.

TESTOVI

1. Koje od tvrdjenja je tačno ako je $\vec{a} \neq 0$.
 - 1) $\text{pr}_{\vec{a}}\vec{b} = \vec{c} \Rightarrow \vec{a} \perp \vec{c}$
 - 2) $\text{pr}_{\vec{a}}\vec{b} = \vec{c} \Rightarrow \vec{a} \perp (\vec{b} - \vec{c})$
 - 3) $\text{pr}_{\vec{a}}\vec{b} = \vec{c} \Leftrightarrow \vec{a}\vec{b} = |\vec{a}|\vec{c}$
 - 4) $\text{pr}_{\vec{a}}\vec{b} = \vec{c} \Rightarrow \vec{a}\vec{b} = \vec{a}\vec{c}$
 - 5) $\text{pr}_{\vec{a}}\vec{b} = \vec{c} \Leftrightarrow \vec{a}\vec{b} = \vec{a}\vec{c}$
 - 6) $\text{pr}_{\vec{a}}\vec{b} = \vec{c} \Rightarrow \vec{a} \parallel \vec{c}$
2. Ako je $\vec{n} \neq 0$, tada važi:
 - 1) $\alpha\vec{n} = \beta\vec{n} \Rightarrow \alpha = \beta$
 - 2) $\alpha\vec{n} = \beta\vec{n} \Leftarrow \alpha = \beta$
 - 3) $\alpha\vec{n} = \beta\vec{n} \Leftrightarrow \alpha = \beta$
3. Za svaki vektor \vec{n} , važi:
 - 1) $\alpha\vec{n} = \beta\vec{n} \Rightarrow \alpha = \beta$
 - 2) $\alpha\vec{n} = \beta\vec{n} \Leftarrow \alpha = \beta$
 - 3) $\alpha\vec{n} = \beta\vec{n} \Leftrightarrow \alpha = \beta$
4. Ako su \vec{a} i \vec{b} nekolinearni vektori, tada važi:
 - 1) $\alpha\vec{a} + \beta\vec{b} = 0 \Rightarrow \alpha = \beta = 0$
 - 2) $\alpha\vec{a} + \beta\vec{b} = 0 \Leftarrow \alpha = \beta = 0$
 - 3) $\alpha\vec{a} + \beta\vec{b} = 0 \Leftrightarrow \alpha = \beta = 0$
5. Za sve nenula vektore \vec{a} i \vec{b} , važi:
 - 1) $\alpha\vec{a} + \beta\vec{b} = 0 \Rightarrow \alpha = \beta = 0$
 - 2) $\alpha\vec{a} + \beta\vec{b} = 0 \Leftarrow \alpha = \beta = 0$
 - 3) $\alpha\vec{a} + \beta\vec{b} = 0 \Leftrightarrow \alpha = \beta = 0$
6. Funkcija $\text{pr}_{\vec{a}} : V \rightarrow \{\alpha\vec{a} | \alpha \in \mathbb{R}\}$, $\text{pr}_{\vec{a}}(\vec{x}) = \frac{\vec{a}\vec{x}}{|\vec{a}|^2}\vec{a}$, $\vec{a} \neq 0$ (V – skup svih slobodnih vektora) je:
 - 1) dobro definisana
 - 2) injektivna
 - 3) surjektivna
 - 4) bijektivna
 - 5) projektovanje na pravu
7. Funkcija $\text{pr}_{\vec{a}} : V \rightarrow V$, $\text{pr}_{\vec{a}}(\vec{x}) = \frac{\vec{a}\vec{x}}{|\vec{a}|^2}\vec{a}$, $\vec{a} \neq 0$ (V – skup svih slobodnih vektora) je:
 - 1) dobro definisana
 - 2) injektivna
 - 3) surjektivna
 - 4) bijektivna
 - 5) projektovanje na pravu
8. Funkcija $\text{pr}_{\pi} : V \rightarrow V$, $\text{pr}_{\pi}(\vec{x}) = \vec{x} - \text{pr}_{\vec{n}}(\vec{x}) = \vec{x} - \frac{\vec{n}\vec{x}}{|\vec{n}|^2}\vec{n}$, $\vec{n} \neq 0$ (V – skup svih slobodnih vektora) je:
 - 1) dobro definisana
 - 2) injektivna
 - 3) surjektivna
 - 4) bijektivna
 - 5) projektovanje na ravan
9. Ako je $Ax+By+C=0$ jednačina prave u ravni xOy i $A \neq B$, tada vektori paralelni sa tom pravom su:
 - a) (A, B)
 - b) $(A, -B)$
 - c) $(-A, B)$
 - d) (B, A)
 - e) $(B, -A)$
 - f) $(-A, -B)$
 - g) $(-B, -A)$
 - h) $(-B, A)$
10. Ako je $Ax+By+C=0$ jednačina prave u ravni xOy i $A \neq B$, tada vektori normalni na tu pravu su:
 - a) (A, B)
 - b) $(A, -B)$
 - c) $(-A, B)$
 - d) (B, A)
 - e) $(B, -A)$
 - f) $(-A, -B)$
 - g) $(-B, -A)$
 - h) $(-B, A)$
11. Za prave $m : \frac{x-2}{3} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z}{5}$ i $n : \frac{x-5}{-6} = \frac{y+1}{4} = \frac{z-5}{-10}$ važi:
 - a) mimoilazne su ($m \cap n = \emptyset \wedge m \not\parallel n$)
 - b) paralelne su i različite ($m \parallel n \wedge m \neq n$)
 - c) poklapaju se ($m = n$)
 - d) sekutice ($m \cap n = \{M\}$)
12. Za prave $m : \frac{x-2}{3} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z}{5}$ i $n : \frac{x-5}{-6} = \frac{y+1}{4} = \frac{z-4}{-10}$ važi:
 - a) mimoilazne su ($m \cap n = \emptyset \wedge m \not\parallel n$)
 - b) paralelne su i različite ($m \parallel n \wedge m \neq n$)
 - c) poklapaju se ($m = n$)
 - d) sekutice ($m \cap n = \{M\}$)
13. Za prave $m : \frac{x-2}{3} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z}{5}$ i $n : \frac{x-5}{-6} = \frac{y+1}{4} = \frac{z-5}{-1}$ važi:
 - a) mimoilazne su ($m \cap n = \emptyset \wedge m \not\parallel n$)
 - b) paralelne su i različite ($m \parallel n \wedge m \neq n$)
 - c) poklapaju se ($m = n$)
 - d) sekutice ($m \cap n = \{M\}$)
14. Za prave $m : \frac{x-2}{3} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z}{5}$ i $n : \frac{x-4}{-6} = \frac{y+2}{4} = \frac{z-4}{-1}$ važi:
 - a) mimoilazne su ($m \cap n = \emptyset \wedge m \not\parallel n$)
 - b) paralelne su i različite ($m \parallel n \wedge m \neq n$)
 - c) poklapaju se ($m = n$)
 - d) sekutice ($m \cap n = \{M\}$)
15. Neka su dati vektori \vec{r}_A i \vec{a} i realan broj d . Ako je $\overrightarrow{AB} \parallel \vec{a}$, $|\overrightarrow{AB}| = d$ i $\overrightarrow{AB} \cdot \vec{a} < 0$ tada je:
 - 1) $\vec{r}_B = \vec{r}_A + d \cdot \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$
 - 2) $\vec{r}_B = \vec{r}_A + d \cdot \vec{a}$
 - 3) $\vec{r}_B = \vec{r}_A - d \cdot \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$
 - 4) $\vec{r}_B = \vec{r}_A - d \cdot \vec{a}$
 - 5) $\vec{r}_B = \vec{r}_A \pm d \cdot \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$
16. Neka su dati vektori \vec{r}_A i \vec{a} i realan broj d . Ako je $\overrightarrow{AB} \parallel \vec{a}$, $|\overrightarrow{AB}| = d$, $|\vec{a}| = 1$ i $\overrightarrow{AB} \cdot \vec{a} < 0$ tada je:
 - 1) $\vec{r}_B = \vec{r}_A + d \cdot \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$
 - 2) $\vec{r}_B = \vec{r}_A + d \cdot \vec{a}$
 - 3) $\vec{r}_B = \vec{r}_A - d \cdot \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$
 - 4) $\vec{r}_B = \vec{r}_A - d \cdot \vec{a}$
 - 5) $\vec{r}_B = \vec{r}_A \pm d \cdot \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$
17. Neka su dati vektori \vec{r}_A i \vec{a} i realan broj d . Ako je $\overrightarrow{AB} \parallel \vec{a}$, $|\overrightarrow{AB}| = d$, $|\vec{a}| = 0,5$ i $\overrightarrow{AB} \cdot \vec{a} < 0$ tada je:
 - 1) $\vec{r}_B = \vec{r}_A + d \cdot \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$
 - 2) $\vec{r}_B = \vec{r}_A + 2d \cdot \vec{a}$
 - 3) $\vec{r}_B = \vec{r}_A - d \cdot \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$
 - 4) $\vec{r}_B = \vec{r}_A - 2d \cdot \vec{a}$
 - 5) $\vec{r}_B = \vec{r}_A \pm d \cdot \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$
18. Jednačina $x + y = 1$, $x \in \mathbb{R}$, $y \in \mathbb{R}$ jeste jednačina:
 - 1) samo prave
 - 2) samo ravni
 - 3) prve i ravni
 - 4) ili prave ili ravni, zavisno od još nekih uslova