

Algebra

Ivan Prokić

Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

Predavanje 7

Na prethodnom času

- Bulove funkcije i logička kola

Apstraktna definicija Bulove algebre

Iskazni račun

Posmatrajmo $(\{\top, \perp\}, \vee, \wedge, \neg, \perp, \top)$, gde operacije $\vee$ i $\wedge$ predstavljaju disjunkciju i konjukciju, a $\neg$ je negacija:

B_1 Komutativnost: Za sve $p, q \in \{\top, \perp\}$ važi

$$p \vee q = q \vee p \quad \text{i} \quad p \wedge q = q \wedge p$$

B_2 Distributivnost: Za sve $p, q, r \in \{\top, \perp\}$ važi

$$p \wedge (q \vee r) = (p \wedge q) \vee (p \wedge r) \quad \text{i} \quad p \vee (q \wedge r) = (p \vee q) \wedge (p \vee r)$$

B_3 Neutralni elementi: Za svako $p \in \{\top, \perp\}$ važi

$$p \vee \perp = p \quad \text{i} \quad p \wedge \top = p$$

B_4 Komplementarnost: Za svako $p \in \{\top, \perp\}$ važi

$$p \vee \neg p = \top \quad \text{i} \quad p \wedge \neg p = \perp$$

Skupovi

Neka je $A \neq \emptyset$. Posmatrajmo $(\mathcal{P}(A), \cup, \cap, \bar{}, \emptyset, A)$, gde je $\mathcal{P}(A)$ partitivni skup od A , operacije $\cup$ i $\cap$ predstavljaju uniju i presek skupova, a $\bar{}$ je komplement ($\bar{X} = A \setminus X$):

B_1 Komutativnost: Za sve $X, Y \in \mathcal{P}(A)$ važi

$$X \cup Y = Y \cup X \quad \text{i} \quad X \cap Y = Y \cap X$$

B_2 Distributivnost: Za sve $X, Y, Z \in \mathcal{P}(A)$ važi

$$X \cap (Y \cup Z) = (X \cap Y) \cup (X \cap Z) \quad \text{i} \quad X \cup (Y \cap Z) = (X \cup Y) \cap (X \cup Z)$$

B_3 Neutralni elementi: Za svako $X \in \mathcal{P}(A)$ važi

$$X \cup \emptyset = X \quad \text{i} \quad X \cap A = X$$

B_4 Komplementarnost: Za svako $X \in \mathcal{P}(A)$ važi

$$X \cup \bar{X} = A \quad \text{i} \quad X \cap \bar{X} = \emptyset$$

Delioci broja 30

Posmatrajmo $(D_{30}, NZS, NZD, x' = \frac{30}{x}, 1, 30)$, gde je $D_{30} = \{1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30\}$ skup delioca broja 30, NZS i NZD najmanji zajednički sadržalac i najveći zajednički delilac:

B_1 Komutativnost: Za sve $x, y \in D_{30}$ važi

$$NZS\{x, y\} = NZS\{y, x\} \quad \text{i} \quad NZD\{x, y\} = NZD\{y, x\}$$

B_2 Distributivnost: Za sve $x, y, z \in D_{30}$ važi

$$NZD\{x, NZS\{y, z\}\} = NZS\{NZD\{x, y\}, NZD\{x, z\}\} \quad \text{i}$$

$$NZS\{x, NZD\{y, z\}\} = NZD\{NZS\{x, y\}, NZS\{x, z\}\}$$

B_3 Neutralni elementi: Za svako $x \in D_{30}$ važi

$$NZS\{x, 1\} = x \quad \text{i} \quad NZD\{x, 30\} = x$$

B_4 Komplementarnost: Za svako $x \in D_{30}$ važi

$$NZS\{x, x'\} = 30 \quad \text{i} \quad NZD\{x, x'\} = 1$$

Apstrakcija: Bulove algebre

Definicija: Uređena šestorka $\mathcal{B} = (B, +, \cdot, ', 0, 1)$, gde je $B \neq \emptyset$, $+, \cdot : B^2 \rightarrow B$, $': B \rightarrow B$ i $0, 1 \in B$. Kažemo da je $\mathcal{B}$ **Bulova algebra** ako važe aksiome:

B_1 **Komutativnost:** Za sve $a, b \in B$ važi

$$a + b = b + a \quad \text{i} \quad a \cdot b = b \cdot a$$

B_2 **Distributivnost:** Za sve $a, b, c \in B$ važi

$$a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c) \quad \text{i} \quad a + (b \cdot c) = (a + b) \cdot (a + c)$$

B_3 **Neutralni elementi:** Za svako $a \in B$ važi

$$a + 0 = a \quad \text{i} \quad a \cdot 1 = a$$

B_4 **Komplementarnost:** Za svako $a \in B$ važi

$$a + a' = 1 \quad \text{i} \quad a \cdot a' = 0$$

Dualnost. Bulovi identiteti

Napomena

Primetimo da se aksiome pojavljuju u paru i da ako u jednoj aksiomi zamenimo mesta simbolima $+$ i $\cdot$, i simbolima 0 i 1 onda ponovo dobijamo aksiomu Bulove algebre.

Posledica

Sledi da će i skup teorema Bulove algebre biti dualan: kad god dokazemo neko tvrđenje u Bulovim algebrama možemo u tvrđenju izvršiti prethodno opisanu zamenu simbola i dobiti da važi njemu dualno tvrđenje.

Napomena

Svi Bulovi identiteti koje smo izveli na prethodim slajdovima zapravo smo izveli iz Bulovih aksioma, tako da oni **važe na svim Bulovim algebrama**.

Podalgebre

Podalgebre i kako ih naći

Definicija (Podalgebre)

Neka je $\mathcal{B} = (B, +, \cdot, ', 0, 1)$ Bulova algebra. Kažemo da je Bulova algebra $\mathcal{C} = (C, +, \cdot, ', 0, 1)$ podalgebra Bulove algebre $\mathcal{B}$ ako je $C \subseteq B$ i operacije iz $\mathcal{C}$ su restrikcije operacija iz $\mathcal{B}$.

Podalgebre i kako ih naći

Definicija (Podalgebre)

Neka je $\mathcal{B} = (B, +, \cdot, ', 0, 1)$ Bulova algebra. Kažemo da je Bulova algebra $\mathcal{C} = (C, +, \cdot, ', 0, 1)$ podalgebra Bulove algebre $\mathcal{B}$ ako je $C \subseteq B$ i operacije iz $\mathcal{C}$ su restrikcije operacija iz $\mathcal{B}$.

Teorema

Neka je $\mathcal{B} = (B, +, \cdot, ', 0, 1)$ Bulova algebra i $C \subseteq B$. Tada je $\mathcal{C} = (C, +, \cdot, ', 0, 1)$, gde su $+$, $\cdot$, $'$ restrikcije operacija iz $\mathcal{B}$, podalgebra algebre $\mathcal{B}$ ako i samo ako za sve $a, b \in C$ važi $a + b \in C$, $a \cdot b \in C$ i $a' \in C$.

Dokaz

($\Rightarrow$): Ako je $\mathcal{C}$ podalgebra od $\mathcal{B}$, onda su operacije u $\mathcal{C}$ restrikcije operacija iz $\mathcal{B}$.

($\Leftarrow$): Pošto sve aksiome Bulovih algebri važe u $\mathcal{B}$, onda važe u $\mathcal{C}$ (jer su operacije iz $\mathcal{C}$ restrikcije operacija iz $\mathcal{B}$), pod uslovom da 0 i 1 iz B pripadaju i C . Ovo sledi iz: ako $a \in C$ onda i $a' \in C$, pa i $a + a' \in C$ i $a \cdot a' \in C$, tj. $1 \in C$ i $0 \in C$.

Primeri podalgebri

Naći sve podalgebre Bulovih algebri:

$(\mathcal{P}(A), \cup, \cap, -, \emptyset, A)$, za $\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, A\}$

$(D_{30}, NZS, NZD, x' = \frac{30}{x}, 1, 30)$, gde je $D_{30} = \{1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30\}$

- $\mathcal{B}_1 = (\mathcal{P}(A), \cup, \cap, -, \emptyset, A)$
- $\mathcal{B}_2 = (\{\emptyset, A\}, \cup, \cap, -, \emptyset, A)$

Primeri podalgebri

Naći sve podalgebre Bulovih algebri:

$(\mathcal{P}(A), \cup, \cap, -, \emptyset, A)$, za $\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, A\}$ $(D_{30}, NZS, NZD, x' = \frac{30}{x}, 1, 30)$, gde je $D_{30} = \{1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30\}$

- $\mathcal{B}_1 = (\mathcal{P}(A), \cup, \cap, -, \emptyset, A)$
- $\mathcal{B}_2 = (\{\emptyset, A\}, \cup, \cap, -, \emptyset, A)$
- $\mathcal{B}_3 = (\{\emptyset, A, \{a\}, \{b, c\}\}, \cup, \cap, -, \emptyset, A)$
- $\mathcal{B}_4 = (\{\emptyset, A, \{b\}, \{a, c\}\}, \cup, \cap, -, \emptyset, A)$
- $\mathcal{B}_5 = (\{\emptyset, A, \{c\}, \{a, b\}\}, \cup, \cap, -, \emptyset, A)$

Primeri podalgebri

Naći sve podalgebre Bulovih algebri:

$(\mathcal{P}(A), \cup, \cap, -, \emptyset, A)$, za $\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, A\}$

$(D_{30}, NZS, NZD, x' = \frac{30}{x}, 1, 30)$, gde je $D_{30} = \{1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30\}$

- $\mathcal{B}_1 = (\mathcal{P}(A), \cup, \cap, -, \emptyset, A)$
- $\mathcal{B}_2 = (\{\emptyset, A\}, \cup, \cap, -, \emptyset, A)$
- $\mathcal{B}_3 = (\{\emptyset, A, \{a\}, \{b, c\}\}, \cup, \cap, -, \emptyset, A)$
- $\mathcal{B}_4 = (\{\emptyset, A, \{b\}, \{a, c\}\}, \cup, \cap, -, \emptyset, A)$
- $\mathcal{B}_5 = (\{\emptyset, A, \{c\}, \{a, b\}\}, \cup, \cap, -, \emptyset, A)$

- $\mathcal{C}_1 = (D_{30}, NZS, NZD, x' = \frac{30}{x}, 1, 30)$
- $\mathcal{C}_2 = (\{1, 30\}, NZS, NZD, x' = \frac{30}{x}, 1, 30)$

Primeri podalgebri

Naći sve podalgebre Bulovih algebri:

$(\mathcal{P}(A), \cup, \cap, -, \emptyset, A)$, za $\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, A\}$

$(D_{30}, NZS, NZD, x' = \frac{30}{x}, 1, 30)$, gde je $D_{30} = \{1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30\}$


- $\mathcal{B}_1 = (\mathcal{P}(A), \cup, \cap, -, \emptyset, A)$
- $\mathcal{B}_2 = (\{\emptyset, A\}, \cup, \cap, -, \emptyset, A)$
- $\mathcal{B}_3 = (\{\emptyset, A, \{a\}, \{b, c\}\}, \cup, \cap, -, \emptyset, A)$
- $\mathcal{B}_4 = (\{\emptyset, A, \{b\}, \{a, c\}\}, \cup, \cap, -, \emptyset, A)$
- $\mathcal{B}_5 = (\{\emptyset, A, \{c\}, \{a, b\}\}, \cup, \cap, -, \emptyset, A)$

- $\mathcal{C}_1 = (D_{30}, NZS, NZD, x' = \frac{30}{x}, 1, 30)$
- $\mathcal{C}_2 = (\{1, 30\}, NZS, NZD, x' = \frac{30}{x}, 1, 30)$
- $\mathcal{C}_3 = (\{1, 30, 2, 15\}, NZS, NZD, x' = \frac{30}{x}, 1, 30)$
- $\mathcal{C}_4 = (\{1, 30, 3, 10\}, NZS, NZD, x' = \frac{30}{x}, 1, 30)$
- $\mathcal{C}_5 = (\{1, 30, 5, 6\}, NZS, NZD, x' = \frac{30}{x}, 1, 30)$

Relacija poretka na Bulovim algebrama


Neke relacije poretka

- Skupovi: $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$, za $A = \{1, 2, 3\}$



Imamo: $X \subseteq Y \Leftrightarrow X \cup Y = Y$

- Delioci broja 30: $(D_{30}, |)$



Imamo: $k | l \Leftrightarrow NZS\{k, l\} = l$

Apstrakcija: relacija poretka na Bulovim algebrama

Definicija

Neka je $\mathcal{B} = (B, +, \cdot, ', 0, 1)$ Bulova algebra. Definišemo relaciju $\preceq$ tako da za sve $a, b \in B$ važi

$$a \preceq b \quad \Leftrightarrow \quad a + b = b$$

Apstrakcija: relacija poretka na Bulovim algebrama

Definicija

Neka je $\mathcal{B} = (B, +, \cdot, ', 0, 1)$ Bulova algebra. Definišemo relaciju $\preceq$ tako da za sve $a, b \in B$ važi

$$a \preceq b \iff a + b = b$$

Teorema

Neka je $\mathcal{B} = (B, +, \cdot, ', 0, 1)$ Bulova algebra. Tada je $\preceq$ relacija poretka na $\mathcal{B}$.

Dokaz

$$(R) (\forall a \in B) a \preceq a$$

$$(A) (\forall a, b \in B) (a \preceq b \wedge b \preceq a) \Rightarrow a = b$$

$$(T) (\forall a, b, c \in B) (a \preceq b \wedge b \preceq c) \Rightarrow a \preceq c$$

Apstrakcija: relacija poretka na Bulovim algebrama

Definicija

Neka je $\mathcal{B} = (B, +, \cdot, ', 0, 1)$ Bulova algebra. Definišemo relaciju $\preceq$ tako da za sve $a, b \in B$ važi

$$a \preceq b \iff a + b = b$$

Teorema

Neka je $\mathcal{B} = (B, +, \cdot, ', 0, 1)$ Bulova algebra. Tada je $\preceq$ relacija poretka na $\mathcal{B}$.

Dokaz

$$(R) \quad (\forall a \in B) \quad a \preceq a \iff a + a = a \quad \text{(iz idempotentnosti)}$$

$$(A) \quad (\forall a, b \in B) \quad (a \preceq b \wedge b \preceq a) \Rightarrow a = b$$

$$(T) \quad (\forall a, b, c \in B) \quad (a \preceq b \wedge b \preceq c) \Rightarrow a \preceq c$$

Apstrakcija: relacija poretka na Bulovim algebrama

Definicija

Neka je $\mathcal{B} = (B, +, \cdot, ', 0, 1)$ Bulova algebra. Definišemo relaciju $\preceq$ tako da za sve $a, b \in B$ važi

$$a \preceq b \iff a + b = b$$

Teorema

Neka je $\mathcal{B} = (B, +, \cdot, ', 0, 1)$ Bulova algebra. Tada je $\preceq$ relacija poretka na $\mathcal{B}$.

Dokaz

$$(R) \quad (\forall a \in B) \quad a \preceq a \iff a + a = a \quad (\text{iz idempotentnosti})$$

$$(A) \quad (\forall a, b \in B) \quad (a \preceq b \wedge b \preceq a) \Rightarrow a = b$$

$$(a \preceq b \wedge b \preceq a) \iff (a + b = b \wedge b + a = a) \Rightarrow a = b \quad (\text{iz komutativnosti})$$

$$(T) \quad (\forall a, b, c \in B) \quad (a \preceq b \wedge b \preceq c) \Rightarrow a \preceq c$$

Apstrakcija: relacija poretka na Bulovim algebrama

Definicija

Neka je $\mathcal{B} = (B, +, \cdot, ', 0, 1)$ Bulova algebra. Definišemo relaciju $\preceq$ tako da za sve $a, b \in B$ važi

$$a \preceq b \iff a + b = b$$

Teorema

Neka je $\mathcal{B} = (B, +, \cdot, ', 0, 1)$ Bulova algebra. Tada je $\preceq$ relacija poretka na $\mathcal{B}$.

Dokaz

$$(R) \quad (\forall a \in B) \quad a \preceq a \iff a + a = a \quad \text{(iz idempotentnosti)}$$

$$(A) \quad (\forall a, b \in B) \quad (a \preceq b \wedge b \preceq a) \Rightarrow a = b$$
$$(a \preceq b \wedge b \preceq a) \iff (a + b = b \wedge b + a = a) \Rightarrow a = b \quad \text{(iz komutativnosti)}$$

$$(T) \quad (\forall a, b, c \in B) \quad (a \preceq b \wedge b \preceq c) \Rightarrow a \preceq c$$
$$(a \preceq b \wedge b \preceq c) \iff (a + b = b \wedge b + c = c) \Rightarrow$$
$$a + c = a + (b + c) = (a + b) + c = b + c = c \quad \text{(iz asocijativnosti)}$$

Neke osobine relacije poretka na Bulovim algebrama

Teorema

Neka je $\mathcal{B} = (B, +, \cdot, ', 0, 1)$ Bulova algebra. Tada za sve $a, b, c \in B$ važi

1. $(a \preceq c \wedge b \preceq c) \Leftrightarrow a + b \preceq c$
2. $(c \preceq a \wedge c \preceq b) \Leftrightarrow c \preceq ab$
3. $(a \preceq c \wedge b \preceq c) \Rightarrow ab \preceq c$
4. $(c \preceq a \wedge c \preceq b) \Rightarrow c \preceq a + b$

Ograničenost, ponovo

Teorema

Neka je $\mathcal{B} = (B, +, \cdot, ', 0, 1)$ Bulova algebra. Tada za sve $a \in B$ važi $0 \preccurlyeq a$ i $a \preccurlyeq 1$.

Dokaz

Prvi deo: $0 \preccurlyeq a \Leftrightarrow 0 + a = a$, što sledi iz aksiome neutralni elementi.

Drugi deo: $a \preccurlyeq 1 \Leftrightarrow a + 1 = 1$, što sledi iz teoreme ograničenost.

Napomena

U svakoj Bulovoj algebri 0 je najmanji, a 1 najveći element.

Teorema

Neka je $\mathcal{B} = (B, +, \cdot, ', 0, 1)$ Bulova algebra. Tada za sve $a \in B$ važi

$$ab = 1 \Leftrightarrow (a = 1 \wedge b = 1)$$


Dokaz

$(\Leftarrow)$: Direktno. $(\Rightarrow)$: $ab = 1 \Rightarrow a + ab = a + 1 \Rightarrow a = 1$ (apsorpcija, ograničenost)


Homomorfizam i izomorfizam

Ovo deluje "isto"

- Skupovi: $(\mathcal{P}(A), \cup, \cap, -, \emptyset, A)$, za $A = \{1, 2, 3\}$



- Deliooci broja 30:
 $(D_{30}, NZS, NZD, x' = \frac{30}{x}, 1, 30)$, gde
 je $D_{30} = \{1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30\}$



Kako da formulišemo da su dve Bulove algebre "iste"?

Homomorfizam i izomorfizam

Definicija (Homomorfizam)

Neka su $\mathcal{B} = (B, +, \cdot, ', 0, 1)$ i $\mathcal{C} = (C, \oplus, \odot, \neg, 0^*, 1^*)$ dve Bulove algebre. Funkcija $\varphi : B \rightarrow C$, se naziva homomorfizam ako za sve $a, b \in B$ važi

1. $\varphi(a + b) = \varphi(a) \oplus \varphi(b)$
2. $\varphi(a \cdot b) = \varphi(a) \odot \varphi(b)$
3. $\varphi(a') = \overline{\varphi(a)}$

Definicija (Izomorfizam)

Bijektivni homomorfizam se naziva izomorfizam.

Primer

Za Bulove algebre $(\mathcal{P}(A), \cup, \cap, -, \emptyset, A)$, za $A = \{a, b, c\}$, i $(D_{30}, NZS, NZD, x' = \frac{30}{x}, 1, 30)$, gde je $D_{30} = \{1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30\}$, jedan izomorfizam je

$$\varphi = \begin{pmatrix} \emptyset & \{a\} & \{b\} & \{c\} & \{a, b\} & \{a, c\} & \{b, c\} & \{a, b, c\} \\ 1 & 2 & 3 & 5 & 6 & 10 & 15 & 30 \end{pmatrix}$$

Treba proveriti da je φ bijekcija i da za sve $X, Y \in \mathcal{P}(A)$ važi

1. $\varphi(X \cup Y) = NZS\{\varphi(X), \varphi(Y)\}$
2. $\varphi(X \cap Y) = NZD\{\varphi(a), \varphi(b)\}$
3. $\varphi(\overline{X}) = (\varphi(X))'$

Reprezentacija Bulovih algebri

Teorema (Teorema Stona o reprezentaciji Bulovih algebri)

Svaka Bulova algebra izomorfna je sa nekom Bulovom algebrom skupova $(\mathcal{P}(A), \cup, \cap, \neg, \emptyset, A)$.

Posledica

Svaka konačna Bulova algebra (a mi radimo samo sa konačnim) ima 2^n elemenata i sve Bulove algebre sa istim brojem elemenata su izomorfne.

Šta smo danas radili

- Apstraktna definicija Bulove algebre