

# Algebra

Ivan Prokić

Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

Predavanje 3


## Na prethodnom času

- Relacije ekvivalencije
  - Klase ekvivalencije i faktor skup (particije)
  - Skup  $\mathbb{Z}_n$
- Relacije poretka (parcijalno uređeni skupovi)
  - Haseov dijagram
  - Najmanji, najveći, min i max elementi
  - Lanci i dobro uređeni skupovi



## Šta su funkcije?

Funkciju  $f$  zamišljamo kao operator koji neke elemente  $x$  pretvara u izlazne elemente  $f(x)$ .



Deo specifikacije svake funkcije mora odgovoriti na pitanja:


- Za koje  $x$  radi?
- Šta sve može biti  $f(x)$ ? Ili barem kom skupu pripada  $f(x)$ ?
- Šta radi  $f$ ?

Bez obzira na to šta tačno radi  $f$ , možemo reći da svako  $f$  mora da ima jednu dobru osobinu:

- Jednu vrednost  $x$  treba uvek da pretvori u isti rezultat, tj. za jedno  $x$  treba da postoji tačno jedan  $f(x)$

## Šta su funkcije?

Funkciju  $f$  zamišljamo kao operator koji neke elemente  $x$  pretvara u izlazne elemente  $f(x)$ .



Deo specifikacije svake funkcije mora odgovoriti na pitanja:

- Za koje  $x$  radi?
- Šta sve može biti  $f(x)$ ? Ili barem kom skupu pripada  $f(x)$ ?
- Šta radi  $f$ ?

**Domen**

**Kodomen**

Bez obzira na to šta tačno radi  $f$ , možemo reći da svako  $f$  mora da ima jednu dobru osobinu:

- Jednu vrednost  $x$  treba uvek da pretvori u isti rezultat, tj. za jedno  $x$  treba da postoji tačno jedan  $f(x)$

**Pravilo funkcije**

## Definicija funkcije

### Definicija (Funkcija skupa $A$ u skup $B$ )

Neka su  $A$  i  $B$  neprazni skupovi. Kažemo da je  $f$  **funkcija** skupa  $A$  u skup  $B$ , u oznaci  $f : A \rightarrow B$ , ako  $f$  svakom elementu skupa  $A$  dodeljuje tačno jedan element skupa  $B$ . Skup  $A$  je **domen** funkcije  $f$ , a skup  $B$  **kodomen** funkcije  $f$ . Ukoliko funkcija  $f$  elementu  $a$  skupa  $A$  dodeljuje element  $b$  skupa  $B$ , to zapisujemo u formi  $(a, b) \in f$ , ili  $f(a) = b$ . Kažemo da je  $a$  **original**, a  $b$  njemu odgovarajuća **slika**.

### Definicija (Skup slika)

Ako je  $f$  funkcija skupa  $A$  u skup  $B$ , **skup slika** funkcije  $f$  je skup

$$f(A) = \{b \mid b \in B \wedge (\exists a \in A) f(a) = b\} = \{f(a) \mid a \in A\}.$$

### Definicija (Jednakost funkcija)


Funkcije  $f : A \rightarrow B$  i  $g : C \rightarrow D$  su **jednake** ako su im jednaki domen, tj.  $A = C$ , jednaki kodomeni  $B = D$  i ako svakom elementu domena na isti način pridružuju element kodomena, tj. za svako  $x \in A$  vredi  $f(x) = g(x)$ .

## Primer funkcije


### Zadatak

Data su dva preslikavanja  $f$  i  $g$ . Koje preslikavanje jeste funkcija, koje nije? Za ono koje jeste napisati domen i skup slika. Za funkciju, šta možemo uzeti kao njen kodomen?

$$f = \{(x, 1), (y, 1), (z, 3)\}$$






$$g = \{(x, 1), (x, 2), (z, 3)\}$$




## Funkcije nad $\mathbb{R}$ : grafik funkcije

$f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  redom su zadate izrazima  $f(x) = x^2$  i  $g(x) = x^3$ . Naći skup slika od  $f$  i od  $g$ . Da li je  $\{(x, y) \mid x^2 + y^2 = 1, x, y \in \mathbb{R}\}$  funkcija?




Funkcije nad  $\mathbb{R}$ : garfik funkcije


$f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  redom su zadate izrazima  $f(x) = x^2$  i  $g(x) = x^3$ . Naći skup slika od  $f$  i od  $g$ . Da li je  $\{(x, y) \mid x^2 + y^2 = 1, x, y \in \mathbb{R}\}$  funkcija?



$$f(\mathbb{R}) = [0, \infty)$$



$$g(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$$



ovo nije funkcija

Pitanje: Kako bismo našli skup slika za funkciju  $i(x) = -\ln(x^2 + 1)$ ? Ovo ćemo kasnije raditi preko kompozicija.



# Injektivnost

## Definicija (Injektivna funkcija (1 – 1))

Funkcija  $f : A \rightarrow B$  je **injektivna** ako za sve  $x_1, x_2 \in A$  važi

$$x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2).$$

## Napomena


Druga definicija injektivnosti:

$$f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$$

## Primer

Naći injektivne funkcije skupa  $A = \{a, b, c\}$ , u skup  $\{1, 2, 3\}$ .

1.  $f_1 = \{(a, 1), (b, 2), (a, 3), (c, 1)\}$
2.  $f_2 = \{(a, 1), (b, 2), (c, 1)\}$
3.  $f_3 = \{(a, 1), (b, 2), (c, 3)\}$



## Injektivnost

### Definicija (Injektivna funkcija (1 – 1))

Funkcija  $f : A \rightarrow B$  je **injektivna** ako za sve  $x_1, x_2 \in A$  važi

$$x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2).$$

### Napomena


Druga definicija injektivnosti:

$$f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$$

### Primer

Naći injektivne funkcije skupa  $A = \{a, b, c\}$ , u skup  $\{1, 2, 3\}$ .

1.  $f_1 = \{(a, 1), (b, 2), (a, 3), (c, 1)\} \quad \perp$
2.  $f_2 = \{(a, 1), (b, 2), (c, 1)\} \quad \perp$
3.  $f_3 = \{(a, 1), (b, 2), (c, 3)\} \quad \top$



## (Injektivna) restrikcija funkcije


### Definicija (Restrikcija funkcije)

Neka je data funkcija  $f : A \rightarrow B$ . Funkcija  $g : C \rightarrow B$  je **restrikcija funkcije**  $f : A \rightarrow B$  ako je  $C \subset A$  i za sve  $x \in C$  važi  $g(x) = f(x)$ . Koristimo i oznaku  $g = f|_C$ . Ako je pri tom  $g$  injektivna, kažemo da je ona **injektivna restrikcija funkcije**  $f$ .


### Primer

Funkcije  $g = f|_{[0, \frac{\pi}{2}]}$  i  $h = f|_{[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]}$  jesu injektivne restrikcije funkcije  $f(x) = \sin(x)$

$$g = f|_{[0, \frac{\pi}{2}]}$$



$$h = f|_{[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]}$$




# Sirjektivnost

## Definicija (Sirjektivnost (na))

Funkcija  $f : A \rightarrow B$  je **sirjektivna (na)** ako za svako  $y \in B$  postoji  $x \in A$  takav da je  $f(x) = y$ , odnosno, ako važi  $f(A) = B$ .

### Primer

Za  $A = \{x, y, z\}$  i  $B = \{1, 2, 3\}$ , data je funkcija  $f : A \rightarrow B$  sa  $f = \{(x, 1), (y, 1), (z, 3)\}$ . Da li je sirjektivna?



## Sirjektivnost


### Definicija (Sirjektivnost (na))

Funkcija  $f : A \rightarrow B$  je **sirjektivna (na)** ako za svako  $y \in B$  postoji  $x \in A$  takav da je  $f(x) = y$ , odnosno, ako važi  $f(A) = B$ .

### Primer

Za  $A = \{x, y, z\}$  i  $B = \{1, 2, 3\}$ , data je funkcija  $f : A \rightarrow B$  sa  $f = \{(x, 1), (y, 1), (z, 3)\}$ . Da li je sirjektivna?

Nije sirjektivna jer je  $f(A) = \{1, 3\}$  (tj. ni jedan original se ne slika u 2).



## Bijekcija

### Napomena

Ako je funkcija  $f : A \rightarrow B$  injektivna, onda pišemo  $f : A \xrightarrow{1-1} B$ ; ako je surjektivna, onda pišemo  $f : A \xrightarrow{na} B$ .

### Definicija (Bijekcija)

Funkciju  $f : A \rightarrow B$  koja je i injektivna i surjektivna zovemo bijekcija i pišemo  $f : A \xrightarrow[na]{1-1} B$ .

### Primer

Za  $A = \{x, y, z\}$  i  $B = \{1, 2, 3\}$ , jedna bijekcija  $f : A \rightarrow B$  je  $f = \{(x, 2), (y, 1), (z, 3)\}$

### Napomena

Bijekcije se još zovu permutacije i uzajamno jednoznačna preslikavanja

## Vežbanje

### Primer

Dati su skupovi  $A = \{1, 2, 3, 4\}$  i  $B = \{a, b, c\}$ , preslikavanja i tabela. Popuniti tabelu sa DA i NE.

$$f_1 = \{(1, a), (2, b)\}$$

$$f_3 = \{(1, c), (2, c), (3, b), (4, b)\}$$

$$f_2 = \{(1, a), (2, b), (3, c), (4, a), (2, a)\}$$

$$f_4 = \{(1, c), (2, b), (3, b), (4, a)\}$$

|       | $f_i : A \rightarrow B$ | $f_i : A \xrightarrow{na} B$ | $f_i : A \xrightarrow{1-1} B$ | $f_i : A \xrightarrow[na]{1-1} B$ |
|-------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| $f_1$ |                         |                              |                               |                                   |
| $f_2$ |                         |                              |                               |                                   |
| $f_3$ |                         |                              |                               |                                   |
| $f_4$ |                         |                              |                               |                                   |

## Vežbanje

### Primer

Dati su skupovi  $A = \{1, 2, 3, 4\}$  i  $B = \{a, b, c\}$ , preslikavanja i tabela. Popuniti tabelu sa DA i NE.

$$f_1 = \{(1, a), (2, b)\}$$

$$f_3 = \{(1, c), (2, c), (3, b), (4, b)\}$$

$$f_2 = \{(1, a), (2, b), (3, c), (4, a), (2, a)\}$$

$$f_4 = \{(1, c), (2, b), (3, b), (4, a)\}$$

|       | $f_i : A \rightarrow B$ | $f_i : A \xrightarrow{na} B$ | $f_i : A \xrightarrow{1-1} B$ | $f_i : A \xrightarrow[na]{1-1} B$ |
|-------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| $f_1$ | NE                      | NE                           | NE                            | NE                                |
| $f_2$ |                         |                              |                               |                                   |
| $f_3$ |                         |                              |                               |                                   |
| $f_4$ |                         |                              |                               |                                   |

## Vežbanje

### Primer

Dati su skupovi  $A = \{1, 2, 3, 4\}$  i  $B = \{a, b, c\}$ , preslikavanja i tabela. Popuniti tabelu sa DA i NE.

$$f_1 = \{(1, a), (2, b)\}$$

$$f_3 = \{(1, c), (2, c), (3, b), (4, b)\}$$

$$f_2 = \{(1, a), (2, b), (3, c), (4, a), (2, a)\}$$

$$f_4 = \{(1, c), (2, b), (3, b), (4, a)\}$$

|       | $f_i : A \rightarrow B$ | $f_i : A \xrightarrow{na} B$ | $f_i : A \xrightarrow{1-1} B$ | $f_i : A \xrightarrow[na]{1-1} B$ |
|-------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| $f_1$ | NE                      | NE                           | NE                            | NE                                |
| $f_2$ | NE                      | NE                           | NE                            | NE                                |
| $f_3$ |                         |                              |                               |                                   |
| $f_4$ |                         |                              |                               |                                   |

## Vežbanje

### Primer

Dati su skupovi  $A = \{1, 2, 3, 4\}$  i  $B = \{a, b, c\}$ , preslikavanja i tabela. Popuniti tabelu sa DA i NE.

$$f_1 = \{(1, a), (2, b)\}$$

$$f_3 = \{(1, c), (2, c), (3, b), (4, b)\}$$

$$f_2 = \{(1, a), (2, b), (3, c), (4, a), (2, a)\}$$

$$f_4 = \{(1, c), (2, b), (3, b), (4, a)\}$$

|       | $f_i : A \rightarrow B$ | $f_i : A \xrightarrow{na} B$ | $f_i : A \xrightarrow{1-1} B$ | $f_i : A \xrightarrow[na]{1-1} B$ |
|-------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| $f_1$ | NE                      | NE                           | NE                            | NE                                |
| $f_2$ | NE                      | NE                           | NE                            | NE                                |
| $f_3$ | DA                      | NE                           | NE                            | NE                                |
| $f_4$ |                         |                              |                               |                                   |

## Vežbanje

### Primer

Dati su skupovi  $A = \{1, 2, 3, 4\}$  i  $B = \{a, b, c\}$ , preslikavanja i tabela. Popuniti tabelu sa DA i NE.

$$f_1 = \{(1, a), (2, b)\}$$

$$f_3 = \{(1, c), (2, c), (3, b), (4, b)\}$$

$$f_2 = \{(1, a), (2, b), (3, c), (4, a), (2, a)\}$$

$$f_4 = \{(1, c), (2, b), (3, b), (4, a)\}$$

|       | $f_i : A \rightarrow B$ | $f_i : A \xrightarrow{na} B$ | $f_i : A \xrightarrow{1-1} B$ | $f_i : A \xrightarrow[na]{1-1} B$ |
|-------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| $f_1$ | NE                      | NE                           | NE                            | NE                                |
| $f_2$ | NE                      | NE                           | NE                            | NE                                |
| $f_3$ | DA                      | NE                           | NE                            | NE                                |
| $f_4$ | DA                      | DA                           | NE                            | NE                                |

## Broj elemenata skupa

### Napomena

- Ako je  $A = \{1, 2, 3, 4\}$  i  $B = \{a, b, c\}$ , da li postoji  $f : A \xrightarrow[na]{1-1} B$  i da li postoji  $g : B \xrightarrow{na} A$ ?
- Da li je  $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  data sa  $f(n) = 2n$  injektivna?

### Definicija

Ako postoji bijekcija  $f : A \xrightarrow[na]{1-1} B$  onda kažemo da  $A$  i  $B$  imaju isti broj elemenata i pišemo  $|A| = |B|$  i  $\text{Card}(A) = \text{Card}(B)$ .

### Teorema

- Za konačan skup  $A$  postoji bijekcija  $f : A \xrightarrow[na]{1-1} \{1, 2, \dots, n\}$  i tada pišemo  $|A| = n$ .
- Skup je beskonačan ako se može injektivno preslikati u svoj pravi podskup.
- Skup  $A$  sa istim brojem elemenata kao  $\mathbb{N}$  zove se **prebrojiv**, i pišemo  $|A| = \aleph_0$
- Skup  $A$  sa istim brojem elemenata kao  $\mathbb{R}$  zove se **neprebrojiv**, i pišemo  $|A| = c$

## Još jedan način zapisa funkcija (i relacija)

### Napomena

Binarnu relaciju  $f = \{(a_1, b_1), (a_2, b_2), \dots, (a_n, b_n)\}$  možemo zapisati na sledeći način

$$f = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ b_1 & b_2 & b_3 & \cdots & b_n \end{pmatrix}$$

Iz ovog zapisa možemo lakše uočiti neke osobine od  $f$ :

- $f$  je funkcija akko su svaka dva elementa u prvoj vrsti različita
- $f$  je funkcija iz skupa  $A$  u skup  $B$  akko je  $f$  funkcija,  $\{a_1, a_2, \dots, a_n\} = A$  i  $\{b_1, b_2, \dots, b_n\} \subseteq B$
- $f$  je injektivna funkcija akko su i u drugoj vrsti svaka dva elementa različita
- $f$  je surjektivna funkcija iz skupa  $A$  u skup  $B$  akko je i  $B = \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$




## Kompozicija funkcija

### Definicija (Kompozicija funkcija)

Neka su  $A, B$  i  $C$  neprazni skupovi i  $f : A \rightarrow B$  i  $g : B \rightarrow C$  funkcije. Tada je i  $g \circ f : A \rightarrow C$  takođe funkcija definisana sa

$$(\forall x \in A)(g \circ f)(x) = g(f(x))$$



## Kompozicija funkcija: osobine

### Teorema

Neka je  $A \neq \emptyset$  i funkcije  $f, g, h : A \rightarrow A$ . Tada važi  $(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$ , tj. važi asocijativnost.

### Dokaz

Po definiciji kompozicije za  $x \in \mathcal{D}(h)$  imamo

$$((f \circ g) \circ h)(x) = (f \circ g)(h(x)) = f(g(h(x))) = f((g \circ h)(x)) = (f \circ (g \circ h))(x)$$

### Primer

Za  $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  definisane sa  $f(x) = x + 3$  i  $g(x) = x^3$  odrediti

$$(f \circ g)(x) =$$

$$(g \circ f)(x) =$$

## Kompozicija funkcija: osobine

### Teorema

Neka je  $A \neq \emptyset$  i funkcije  $f, g, h : A \rightarrow A$ . Tada važi  $(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$ , tj. važi asocijativnost.

### Dokaz

Po definiciji kompozicije za  $x \in \mathcal{D}(h)$  imamo

$$((f \circ g) \circ h)(x) = (f \circ g)(h(x)) = f(g(h(x))) = f((g \circ h)(x)) = (f \circ (g \circ h))(x)$$

### Primer

Za  $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  definisane sa  $f(x) = x + 3$  i  $g(x) = x^3$  odrediti

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(x^3) = x^3 + 3$$

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(x + 3) = (x + 3)^3$$

Primeri  $f \circ g \neq g \circ f$  u ovom primeru.

# Inverzna funkcija

## Primer

*Setimo se inverzne binarne relacije. Za sledeće funkcije odredi inverzne binarne relacije:*

1.  $f = \{(1, a), (2, b)\}$
2.  $g = \{(1, a), (2, b), (3, b)\}$

# Inverzna funkcija

## Primer

*Setimo se inverzne binarne relacije. Za sledeće funkcije odredi inverzne binarne relacije:*

1.  $f = \{(1, a), (2, b)\}$

$$f^{-1} = \{(a, 1), (b, 2)\}$$

2.  $g = \{(1, a), (2, b), (3, b)\}$

$$g^{-1} = \{(a, 1), (b, 2), (b, 3)\}$$

# Inverzna funkcija

## Primer

*Setimo se inverzne binarne relacije. Za sledeće funkcije odredi inverzne binarne relacije:*

1.  $f = \{(1, a), (2, b)\}$

$$f^{-1} = \{(a, 1), (b, 2)\}$$

2.  $g = \{(1, a), (2, b), (3, b)\}$

$$g^{-1} = \{(a, 1), (b, 2), (b, 3)\}$$

## Definicija (Inverzna funkcija)

**Inverzna funkcija** bijektivne funkcije  $f : A \rightarrow B$  je funkcija  $f^{-1} : B \rightarrow A$ , takva da je  $f^{-1}(b) = a$  ako i samo ako je  $f(a) = b$ .

## Inverzna funkcija

Za sledeće funkcije odrediti inverzne funkcije (ako postoje):

1.  $f_1 = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4)\}$

2.  $f_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$

3.  $f_3 = \{(x, 2x + 1) \mid x \in \mathbb{R}\}$

4.  $f_4 = \{(x, x^2) \mid x \in \mathbb{R}\}$

5.  $f_5 = \{(x, x^2) \mid x \in \mathbb{R}^+ \cup \{0\}\}$

6.  $f_6 = \{(x, e^x) \mid x \in \mathbb{R}\}$

## Inverzna funkcija

Za sledeće funkcije odrediti inverzne funkcije (ako postoje):

1.  $f_1 = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4)\}$

$$f_1^{-1} = \{(2, 1), (3, 2), (4, 3)\}$$

2.  $f_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$

3.  $f_3 = \{(x, 2x + 1) \mid x \in \mathbb{R}\}$

4.  $f_4 = \{(x, x^2) \mid x \in \mathbb{R}\}$

5.  $f_5 = \{(x, x^2) \mid x \in \mathbb{R}^+ \cup \{0\}\}$

6.  $f_6 = \{(x, e^x) \mid x \in \mathbb{R}\}$

## Inverzna funkcija

Za sledeće funkcije odrediti inverzne funkcije (ako postoje):

1.  $f_1 = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4)\}$

$$f_1^{-1} = \{(2, 1), (3, 2), (4, 3)\}$$

2.  $f_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$

$$f_2^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

3.  $f_3 = \{(x, 2x + 1) \mid x \in \mathbb{R}\}$

4.  $f_4 = \{(x, x^2) \mid x \in \mathbb{R}\}$

5.  $f_5 = \{(x, x^2) \mid x \in \mathbb{R}^+ \cup \{0\}\}$

6.  $f_6 = \{(x, e^x) \mid x \in \mathbb{R}\}$

## Inverzna funkcija

Za sledeće funkcije odrediti inverzne funkcije (ako postoje):

1.  $f_1 = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4)\}$

$$f_1^{-1} = \{(2, 1), (3, 2), (4, 3)\}$$

2.  $f_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$

$$f_2^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

3.  $f_3 = \{(x, 2x + 1) \mid x \in \mathbb{R}\}$

$$f_3^{-1} = \{(x, \frac{x-1}{2}) \mid x \in \mathbb{R}\}$$

4.  $f_4 = \{(x, x^2) \mid x \in \mathbb{R}\}$

5.  $f_5 = \{(x, x^2) \mid x \in \mathbb{R}^+ \cup \{0\}\}$

6.  $f_6 = \{(x, e^x) \mid x \in \mathbb{R}\}$

$$f_3^{-1} = \{(2x + 1, x) \mid x \in \mathbb{R}\} = \{(t, \frac{t-1}{2}) \mid t \in \mathbb{R}\}$$

## Inverzna funkcija

Za sledeće funkcije odrediti inverzne funkcije (ako postoje):

1.  $f_1 = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4)\}$

$$f_1^{-1} = \{(2, 1), (3, 2), (4, 3)\}$$

2.  $f_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$

$$f_2^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

3.  $f_3 = \{(x, 2x + 1) \mid x \in \mathbb{R}\}$

$$f_3^{-1} = \{(x, \frac{x-1}{2}) \mid x \in \mathbb{R}\}$$

4.  $f_4 = \{(x, x^2) \mid x \in \mathbb{R}\}$

ne postoji,  $f_4$  nije 1-1

5.  $f_5 = \{(x, x^2) \mid x \in \mathbb{R}^+ \cup \{0\}\}$

6.  $f_6 = \{(x, e^x) \mid x \in \mathbb{R}\}$

$$f_4(1) = f_4(-1)$$

## Inverzna funkcija

Za sledeće funkcije odrediti inverzne funkcije (ako postoje):

1.  $f_1 = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4)\}$

$$f_1^{-1} = \{(2, 1), (3, 2), (4, 3)\}$$

2.  $f_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$

$$f_2^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

3.  $f_3 = \{(x, 2x + 1) \mid x \in \mathbb{R}\}$

$$f_3^{-1} = \{(x, \frac{x-1}{2}) \mid x \in \mathbb{R}\}$$

4.  $f_4 = \{(x, x^2) \mid x \in \mathbb{R}\}$

ne postoji,  $f_4$  nije 1-1

5.  $f_5 = \{(x, x^2) \mid x \in \mathbb{R}^+ \cup \{0\}\}$

$$f_5^{-1} = \{(x, \sqrt{x}) \mid x \in \mathbb{R}^+ \cup \{0\}\}$$

6.  $f_6 = \{(x, e^x) \mid x \in \mathbb{R}\}$

$$f_5^{-1} = \{(x^2, x) \mid x \in \mathbb{R}^+ \cup \{0\}\} = \{(t, \sqrt{t}) \mid t \in \mathbb{R}^+ \cup \{0\}\}$$

## Inverzna funkcija

Za sledeće funkcije odrediti inverzne funkcije (ako postoje):

1.  $f_1 = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4)\}$

$$f_1^{-1} = \{(2, 1), (3, 2), (4, 3)\}$$

2.  $f_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$

$$f_2^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

3.  $f_3 = \{(x, 2x + 1) \mid x \in \mathbb{R}\}$

$$f_3^{-1} = \{(x, \frac{x-1}{2}) \mid x \in \mathbb{R}\}$$

4.  $f_4 = \{(x, x^2) \mid x \in \mathbb{R}\}$

ne postoji,  $f_4$  nije 1-1

5.  $f_5 = \{(x, x^2) \mid x \in \mathbb{R}^+ \cup \{0\}\}$

$$f_5^{-1} = \{(x, \sqrt{x}) \mid x \in \mathbb{R}^+ \cup \{0\}\}$$

6.  $f_6 = \{(x, e^x) \mid x \in \mathbb{R}\}$

$$f_6^{-1} = \{(x, \ln x) \mid x \in \mathbb{R}^+\}$$

$$f_6^{-1} = \{(e^x, x) \mid x \in \mathbb{R}\} = \{(t, \ln t) \mid t \in \mathbb{R}^+\}$$

## Kompozicija i inverzna: primeri

Neka je  $A = \{1, 2, 3\}$  i  $f, g : A \rightarrow A$  zadate sa  $f = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$  i  $g = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ .

Odrediti (ako je moguće):  $f^{-1}$ ,  $g^{-1}$ ,  $f \circ f$ ,  $f \circ g$ ,  $g \circ f$ ,  $(g \circ f)^{-1}$  i  $f^{-1} \circ g^{-1}$ .

$$f^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$f \circ g = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$(g \circ f)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$g^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$g \circ f = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$f^{-1} \circ g^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$f \circ f = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

## Kompozicija i inverzna: primeri

Neka je  $A = \{1, 2, 3\}$  i  $f, g : A \rightarrow A$  zadate sa  $f = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$  i  $g = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ .

Odrediti (ako je moguće):  $f^{-1}$ ,  $g^{-1}$ ,  $f \circ f$ ,  $f \circ g$ ,  $g \circ f$ ,  $(g \circ f)^{-1}$  i  $f^{-1} \circ g^{-1}$ .

$$f^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$f \circ g = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$(g \circ f)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$g^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$g \circ f = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$f^{-1} \circ g^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$f \circ f = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

## Kompozicija i inverzna: primeri

Neka je  $A = \{1, 2, 3\}$  i  $f, g : A \rightarrow A$  zadate sa  $f = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$  i  $g = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ .

Odrediti (ako je moguće):  $f^{-1}$ ,  $g^{-1}$ ,  $f \circ f$ ,  $f \circ g$ ,  $g \circ f$ ,  $(g \circ f)^{-1}$  i  $f^{-1} \circ g^{-1}$ .

$$f^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$f \circ g = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$(g \circ f)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$g^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$g \circ f = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$f^{-1} \circ g^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$f \circ f = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

## Kompozicija i inverzna: primeri

Neka je  $A = \{1, 2, 3\}$  i  $f, g : A \rightarrow A$  zadate sa  $f = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$  i  $g = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ .

Odrediti (ako je moguće):  $f^{-1}$ ,  $g^{-1}$ ,  $f \circ f$ ,  $f \circ g$ ,  $g \circ f$ ,  $(g \circ f)^{-1}$  i  $f^{-1} \circ g^{-1}$ .

$$f^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$f \circ g = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$(g \circ f)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$g^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$g \circ f = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$f^{-1} \circ g^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$f \circ f = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

## Kompozicija i inverzna: primeri

Neka je  $A = \{1, 2, 3\}$  i  $f, g : A \rightarrow A$  zadate sa  $f = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$  i  $g = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ .

Odrediti (ako je moguće):  $f^{-1}$ ,  $g^{-1}$ ,  $f \circ f$ ,  $f \circ g$ ,  $g \circ f$ ,  $(g \circ f)^{-1}$  i  $f^{-1} \circ g^{-1}$ .

$$f^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$f \circ g = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(g \circ f)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ & & \end{pmatrix}$$

$$g^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$g \circ f = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ & & \end{pmatrix}$$

$$f^{-1} \circ g^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ & & \end{pmatrix}$$

$$f \circ f = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

## Kompozicija i inverzna: primeri

Neka je  $A = \{1, 2, 3\}$  i  $f, g : A \rightarrow A$  zadate sa  $f = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$  i  $g = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ .

Odrediti (ako je moguće):  $f^{-1}$ ,  $g^{-1}$ ,  $f \circ f$ ,  $f \circ g$ ,  $g \circ f$ ,  $(g \circ f)^{-1}$  i  $f^{-1} \circ g^{-1}$ .

$$f^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$f \circ g = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(g \circ f)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ & & \end{pmatrix}$$

$$g^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$g \circ f = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

$$f^{-1} \circ g^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ & & \end{pmatrix}$$

$$f \circ f = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

## Kompozicija i inverzna: primeri

Neka je  $A = \{1, 2, 3\}$  i  $f, g : A \rightarrow A$  zadate sa  $f = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$  i  $g = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ .

Odrediti (ako je moguće):  $f^{-1}$ ,  $g^{-1}$ ,  $f \circ f$ ,  $f \circ g$ ,  $g \circ f$ ,  $(g \circ f)^{-1}$  i  $f^{-1} \circ g^{-1}$ .

$$f^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$f \circ g = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(g \circ f)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

$$g^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$g \circ f = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

$$f^{-1} \circ g^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$f \circ f = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

## Kompozicija i inverzna: primeri

Neka je  $A = \{1, 2, 3\}$  i  $f, g : A \rightarrow A$  zadate sa  $f = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$  i  $g = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ .

Odrediti (ako je moguće):  $f^{-1}$ ,  $g^{-1}$ ,  $f \circ f$ ,  $f \circ g$ ,  $g \circ f$ ,  $(g \circ f)^{-1}$  i  $f^{-1} \circ g^{-1}$ .

$$f^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$f \circ g = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(g \circ f)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

$$g^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$g \circ f = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

$$f^{-1} \circ g^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

$$f \circ f = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

## Napomena

Generalno,  $f \circ g \neq g \circ f$ , tj. ne važi komutativnost kompozicije.

## Identička, inverzna funkcija i kompozicija

### Definicija (Identička funkcija)

Neka je  $A \neq \emptyset$ . Funkcija  $i_d : A \rightarrow A$  definisana sa  $(\forall x \in A) i_d(x) = x$ , se naziva *identička funkcija skupa A*. Primetimo da je  $i_d$  bijekcija i da je  $f \circ i_d = i_d \circ f = f$ .

### Lema

Neka je  $A \neq \emptyset$ ,  $f, g : A \xrightarrow[na]{1-1} A$  i  $i_d$  identička funkcija skupa  $A$ . Tada važi  $f \circ g = i_d$  akko  $g = f^{-1}$  (i takođe  $f = g^{-1}$ ).

### Lema


Neka je  $A \neq \emptyset$ ,  $f, g : A \xrightarrow[na]{1-1} A$  i  $i_d$  identička funkcija skupa  $A$ . Tada je

$$(f \circ g)^{-1} = g^{-1} \circ f^{-1}$$

### Dokaz

$$(f \circ g) \circ (g^{-1} \circ f^{-1}) = f \circ (g \circ g^{-1}) \circ f^{-1} = f \circ i_d \circ f^{-1} = f \circ f^{-1} = i_d$$

## Inverzna od kompozicije



## Kompozicija nekih specijalnih funkcija i množenje matrica

Neka su date funkcije  $f, g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ ,

$$f(x, y) = (2x + y, x - y),$$

$$g(x, y) = (x + 3y, -2x + y),$$

za  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ . Tada je

$$\begin{aligned}(f \circ g)(x, y) &= f(g(x, y)) = f(x + 3y, -2x + y) \\&= (2(x + 3y) + (-2x + y), x + 3y - (-2x + y)) \\&= (7y, 3x + 2y).\end{aligned}$$

Primeti: Ako su

$$M_f = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}, \quad M_g = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$$

Tada je

$$M_f \cdot M_g = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 7 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$$



## Primeri

Za sledeće realne funkcije naći domen i skup slika (i prokomentarisati 1 – 1 i *na*)

1.  $f(x) = -x$
2.  $g(x) = \ln x$
3.  $h(x) = x^2 + 1$

## Primeri


Za sledeće realne funkcije naći domen i skup slika (i prokomentarisati 1 – 1 i *na*)

1.  $f(x) = -x$

$$\mathcal{D}(f) = \mathbb{R}, f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$$

2.  $g(x) = \ln x$

3.  $h(x) = x^2 + 1$



## Primeri

Za sledeće realne funkcije naći domen i skup slika (i prokomentarisati 1 – 1 i  $na$ )



1.  $f(x) = -x$

$$\mathcal{D}(f) = \mathbb{R}, f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$$

2.  $g(x) = \ln x$

$$\mathcal{D}(g) = \mathbb{R}^+, g(\mathbb{R}^+) = \mathbb{R}$$

3.  $h(x) = x^2 + 1$



## Primeri

Za sledeće realne funkcije naći domen i skup slika (i prokomentarisati 1 – 1 i  $na$ )

1.  $f(x) = -x$




2.  $g(x) = \ln x$

3.  $h(x) = x^2 + 1$

$$\mathcal{D}(f) = \mathbb{R}, f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$$

$$\mathcal{D}(g) = \mathbb{R}^+, g(\mathbb{R}^+) = \mathbb{R}$$

$$\mathcal{D}(h) = \mathbb{R}, h(\mathbb{R}) = [1, \infty)$$



## Primeri: nastavak


Za funkciju  $i(x) = -\ln(x^2 + 1)$  naći domen i skup slika (i prokomentarisati  $1 - 1$  i  $na$ )

## Primeri: nastavak

Za funkciju  $i(x) = -\ln(x^2 + 1)$  naći domen i skup slika (i prokomentarisati 1 – 1 i *na*)

Primetimo  $\mathcal{D}(i) = \mathbb{R}$ , jer je  $x^2 + 1 > 0$ , za sve  $x \in \mathbb{R}$  i

$$i(x) = (f \circ g \circ h)(x) = f(g(h(x)))$$







## Šta smo danas radili

- Funkcije skupa  $A$  u skup  $B$
- Injektivnost i surjektivnost
- Bijekcija
- Kompozicija funkcija
- Inverzna funkcija