

Test 3 Prezime, ime, br. indeksa: _____

U svakom zadatku dato je više odgovora, a treba zaokružiti tačne odgovore tj. slova ili brojeve ispred tačnih odgovora. U jednom istom zadatku broj tačnih odgovora može biti $0, 1, 2, 3, \dots, svi$. U nekim zadacima ostavljena su prazna mesta za upisivanje odgovora.

- $i^{100} =$ $i^{11} =$ $i^{2015} =$ $(-i)^{54} =$
- Izračunati:
 $\sin \frac{\pi}{6} =$ $\cos(-\frac{\pi}{4}) =$ $\cos \frac{4\pi}{3} =$ $\sin(-\frac{\pi}{2}) =$

- Napisati sledeće kompleksne brojeve u eksponencijalnom obliku:

$$3i = -5 = -2i = 7 =$$

$$-1 + i = 1 - \sqrt{3}i =$$

$$2\sqrt{3} + 2i = -2 - 2i =$$

- Napisati sledeće kompleksne brojeve u trigonometrijskom obliku:

$$1 + i = -1 - \sqrt{3}i =$$

$$-2\sqrt{3} + 2i = 2 - 2i =$$

- Vrednost izraza $e^{\frac{\pi}{2}i} + 7e^{\pi i} - 2e^{-\frac{\pi}{2}i}$ u algebarskom obliku je:

- Neka je $z_1 = 1 + i$ i $z_2 = -2 + 5i$ Odrediti:

$$Re(z_1) = Im(z_2) = \overline{z_1} = |z_2| = 2z_1 - z_2 =$$

$$\arg(z_1) = z_1^{10} = z_1 z_2 = \frac{z_2}{z_1} =$$

- Izračunati: a) $\arg(1-i) =$ b) $|1-i| =$

$$c) (1-i)^3 = d) \frac{1-i}{2-i} =$$

$$e) (1-i)(2-i) =$$

- Skup S kompleksnih rešenja jednačine $x^4 - 1 = 0$ je $S = \{ \}$

- Skup S realnih rešenja jednačine $x^4 - 1 = 0$ je $S = \{ \}$

- Odrediti skup svih vrednosti za $\sqrt[3]{-i} \in \{ \}$

- Odrediti skup svih vrednosti za $\sqrt[3]{-1} \in \{ \}$

- Odrediti skup svih vrednosti za $\sqrt[3]{e^{\frac{\pi}{3}i}} \in \{ \}$

- Neka su $z_1 = \sqrt{2}e^{-\frac{\pi}{3}i}$ i $z_2 = 2 - 2i$. Odrediti:

$$|z_1| =$$

$$\overline{z_1} =$$

$$|z_2| =$$

$$\overline{z_2} =$$

$$\arg(z_1) =$$

$$\arg(z_2) =$$

$$|z_1 z_2| =$$

$$\left| \frac{z_1}{z_2} \right| =$$

- Za kompleksne brojeve $z, z_1, z_2 \neq 0$ važi:

- 1)** $\operatorname{Re}(\overline{z_1 - z_2}) = \operatorname{Re}(\bar{z}_1) - \operatorname{Re}(\bar{z}_2)$ **2)** $\operatorname{Im}(z) = \frac{1}{2i}(\bar{z} - z)$ **3)** $|z| = |\bar{z}|$ **4)** $\operatorname{Im}(z_1 z_2) = \operatorname{Im}(z_1) \cdot \operatorname{Im}(z_2)$
- 5)** $\operatorname{Re}(z) = \frac{1}{2}(z - \bar{z})$ **6)** $\operatorname{Im}(z_1 + z_2) = \operatorname{Im}(z_1) + \operatorname{Im}(z_2)$ **7)** $\overline{\left(\frac{z_1}{z_2} \right)} = \frac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2}$ **8)** $\alpha \in \mathbb{R} \Rightarrow \bar{\alpha} = \alpha$
- 9)** $\overline{z_1 \cdot z_2} = \overline{z_2} \cdot \overline{z_1}$ **10)** Četvorougao $O, z_1, z_1 + z_2, z_2$ je paralelogram. **11)** $\operatorname{Im}(z) = \frac{1}{2i}(z - \bar{z})$
- 12)** $|z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2|$ **13)** $\left| \frac{z_1}{z_2} \right| = |z_1| - |z_2|$ **14)** $\overline{z_1 + z_2} = \overline{z_1} \cdot \overline{z_2}$ **15)** $\operatorname{Re}(z_1 \cdot z_2) = \operatorname{Re}(z_1) \cdot \operatorname{Re}(z_2)$

- Za kompleksne brojeve $z_1 = \rho_1 e^{\varphi_1 i}$ i $z_2 = \rho_2 e^{\varphi_2 i}$ važi:

- 1)** $\overline{z_1} = \rho_1 e^{-\varphi_1 i}$ **2)** $|z_2| = \rho_2$ **3)** $\arg(z_1) = \varphi_2$
4) $z_1^{10} = \rho_1^{10} e^{10 \cdot \varphi_1 i}$ **5)** $z_1 \cdot z_2 = \rho_2 \cdot \rho_1 e^{(\varphi_1 + \varphi_2)i}$ **6)** $\frac{z_1}{z_2} = \frac{\rho_1}{\rho_2} e^{(\varphi_1 - \varphi_2)i}$

- Neka je $z = 3 + 2i$, $u = 1 + i$ i $w = 2 - i$.

1) Rotacijom tačke z oko tačke u za ugao $\frac{\pi}{2}$ dobija se tačka $v = 3i$

2) translacijom tačke z za vektor w dobija se tačka $s = 5 + i$

3) $\angle zuw = -\frac{\pi}{2}$

4) $\angle wuz = \frac{\pi}{2}$

- Ako su data dva susedna temena kvadrata $z_1 = 2 + 2i$ i $z_2 = 4$:

1) Koliko ima različitih kvadrata čija su temena z_1 i z_2 :

2) Naći preostala temena kvadrata tako da njihova temena nemaju negativne imaginarne delove

3) Naći težiste kvadrata

- Ako je težište pravilnog šestougla z_0 i jedno njegovo teme z_1 , naći preostala temena u zavisnosti od z_0 i z_1 .

- Neka je $z = 1 + 2i$ i $w = 2 - i$. Naći ugao $\angle w0z =$